


Bóðsrit Bessastaða skóla.


1846.


Leiðarvisir

ad þekkja stjörnur II.

Skólaskýrsla 1845-1846







**P O D S U J E**

til að hlusta á ena

# **Opinbern yfirheyrslu**

i

**B e s a f t a d a f k ó l a**

þann 22 — 28 maí 1846.

- 
1. Leidarvísir til að þekkja stjórnur. Síðari parturinn saminn af **B. Gunnlaugssyni**.
  2. Skólastýrsla, saminn af Lector theol. **J. Jónssyni**, R. af Dbr.
- 

---

**N e y f j a v i t.**

Prentað í prentsmidju landsins, af **Helga Helgassyni**,  
**1846.**

U N I V E R S I T Y

of the State of New York

# THE STATE OF NEW YORK

IN SENATE

JANUARY 25, 1891

REPORT OF THE  
COMMISSIONER OF THE  
LAND OFFICE  
IN RESPONSE TO A  
RESOLUTION PASSED  
BY THE SENATE  
JANUARY 25, 1891

ALBANY:

WILLIAM H. SAWYER, STATE PRINTER

1891

## Y f i r l i t

Íðara partsins af þessum leidarvísí.

---

Þriðja grein um býrarefna.

Sjórdá grein um suburmerlin.

Simmta grein um þíð tórnþla þímínþvolf.

---

## 114126

Recovery was 100% in spring and 100% in summer.

...and the other side of the mountain.

အိတ်ကလေးကို ခုတ် ချိတ် ချိတ် ချိတ်

Stimulate protein synthesis



---

## Þriðja grein.

um

### Dýræreimina.

---

Dýræreimin er senn beltí nokkurt yfirum þveran himin frá vestri til austurs; er það að norðan og sunnan innilofað milli tveggja hringa, er menn í fyrri daga héldu að jarðstjörnuarnar (pláneturnar) aldrei geingu útförir til norðurs eða suðurs; og það gjöra heldur ekki þar svo nefndu gomlu jarðstjörnur, ekki Uranns og ekki sólín eða tänglíd. Af því nefndu menn þessa samfíða liggjandi hringa úthlaupsþringa (circulos excursuum). Þar á móti láta hinar nýfundnu jarðstjörnur sumar hvorjar ekki marka sér þvilíf síð, og heldur ekki þalastjörnuarnar. Millibil þessara hringa er 20 gráður alftadar. En í miðju þessu bili liggur Sólbrautin, eða vegur sá um himininn, er sólín sýnist ganga allt árið um fríng, undir eins og jörðin í raun rétti, en ekki sólín, geingur sama hring; hvað ed sést frá sólinni, því þaðan er sú rétta sjónin. En þar ed jörðin geingur í fríngum sólína, en sólín ekki í fríngum jörðina, þá ber sólína samámsaman í alla þá somu þínkta fest-

ingarinnar, árid um fring, sem jördina ber í, frá sólunni að sjá, nema hvað það alltaf eru hinir gagnstæðu punktar er sólina og jördina ber í, þannig að um hásumarid ber jördina frá sól að sjá í Steingeitarmerki, en sólina frá jörd að sjá í Krabbamerki; og aptur á mót um hávetur, ber jördina frá sól að sjá í Krabbamerki, en sólina frá jörd að sjá í Steingeitarmerki. Þannig geingur þetta allan ársþringinn, að sól og jörd sýnast í gagnstæðum himinpunktum frá jörðu og sól, og jörðin vinnur upp árlega alla þá punkta sem sólir uppvinnur, svo jarðbrautin, frá sólunni að sjá, er öldungis sami þringurinn sem sólbrautin frá jörðinni að sjá. Nú liggur eins og áður er sagt, sólbrautin midt á milli úthlaupsþringanna, verða svo úthlaupsþringarnir  $10^{\circ}$  á báðar síður frá sólbrautinni, mældar til norðurs og suðurs. Þýræiminni, sem liggur milli úthlaupsþringanna, er skipt eptir leingdiinni í 12 merki, er liggja í röð austur eptir himinnum, uns komid er þringinn í fring, og sama gjörðin byrjar aptur. Þetta eru þau svokölluðu Sólmerki, er sólir sýnast ganga í gegnum árlega. Sólmerkin heita þannig:

Þrúturinn, Urinn, Tvíburarnir, Krabbinn, Ljónid, Meyin, Metastálarinnar, Sporbðrefinn, Bogmadurinn, Steingeitin, Vatnsberinn, Fiskarnir.

Þetta er röðin, talin austureptir; á latínu eru þessi vers gjörð til minnis:

Sunt aries, taurus, gemini, cancer, leo, virgo, libraque, scorpius, arcitenens, caper, amphora, pisces:

Lundireins og belti þetta partast þannig í fund-  
 ur í 12 parta, þá partast lífa sólbrautin sjálf, er  
 liggur eptir því miðu, og fá þeir partar í sól-  
 brautinni sama nafn, sem þeir tilvarandi partar í  
 Þhræiminni, þó með þeim mismun, að partarnir  
 í sólbrautinni mælast öldungis jafnir,  $30^{\circ}$  hvor, í  
 stað þess að í Þhræiminni ráða stjörnuflokkarnir  
 sjálfir. Lífa byrjast Grúturinn í sólbrautinni ætíð  
 við vorjafndægrapúnktinn, sem vegna framsófnarinn-  
 ar færist alltaf til vesturs  $50^{\circ}21'$  árlega, þó nokkud  
 sé ójafnt, hvað ed á  $71\frac{1}{2}$  ári mundi gjöra 1 gráðu,  
 og á 100 árum  $1^{\circ}23'41''$ ; og hérumbil á 25900  
 árum heilan hring; svo að á þeim tíma á vorjafn-  
 dægrapúnkturinn hérumbil að vera blúinn að hlaupa  
 í gegnum öll sólmerkinn aptur á bak eda til vesturs.  
 Þegar menn fyrst aðgættu himininn, hefur vorjafn-  
 dægrapúnkturinn verið vestast í stjörnuflokknum Grúts-  
 merki, og þaraf hefur fyrsti kablinn í sólbrautinni  
 feingid sama heiti sem fyrsti kablinn í Þhræiminni,  
 nefnilega heitið Grútur. Nú er vorfnúturinn geing-  
 inn þadan vestur í Tistamerkið, sem þar er næst;  
 eru svo allar stjörnurnar Grútmerkisins komnar í  
 Uramerki sólbrautarinnar. Sú hér ákvedna tíma-  
 leingd, á hverri framsófnin uppvinnur hringinn, er  
 nokkud leingri enn sú er áður er ákvedin í Leidarvis-  
 isins 1. parti bls. 29, kemur þetta af því, að menn  
 vita ekki að fullu meðalhófið í framsófninni, þó hof-  
 ndregla heumar og skjóttid á báðar síður sé kunn-  
 ugt orðid. Samt er eptir nýustu rannsófnunni árs-  
 færslan  $50^{\circ}21'$  að meðalhófi.

## I. S r ú t u r i n n.

Þessi hrútur gaf eptir godafræði Gríffja til-  
 efnið til leidangurs Argóverjanna til Colchis. At-  
 harnas kóngur í Boótiu, átti með fyrri konu sínni  
 Nephelé tvo börn, soninn Þhrirus og dótturina Helle;  
 stjúpfa þeirra var Júnó, sem reyndist þeim illa. Móð-  
 ir þeirra Nephelé, byrtist þeim um midnætti og fékk  
 þeim hrútið Chrysomallos, er hún hafði feingið af  
 Hermes. Hrúturinn hafði mannsvit og mál, og gat  
 farið lopt og lög. Skinnid á honum var gulllegt  
 og hornin stínu eins og tvö hálfstúgl. Somu nótt  
 fóru systkynin ridandi á hrútinum yfir land og sjó;  
 en Helli sundladi og datt hún af baki í Helle's-haf,  
 eða Hellespontus. Þhrirus komst til Colchis, til  
 Aletesar kóngs, er tók honum vel, og gaf honum  
 dóttur sína Calciope til eigin konu. Þhrirus fórn-  
 adi Júníþer hrútinum, en skinnid gaf hann Aletesi  
 er helgadi það gúðinum Mars, við hvorn mánuður-  
 inn Martius er kændur. Skinnid negldi hann með  
 gullnoglum á eyk eina í þeim helga landi, og setti  
 stóran dreka til að varðveita það, því eptir goda-  
 spá átti hann að lifa meðan skinnid væri hans eign.  
 En ei að síður sótti Jason það á skipinu Argó.

Mínulega hálfri annari stund á undan Sjöstirni-  
 inn, þó heldur dálitill lægra á lopti, þegar það er í  
 súdri, sér maður tvær stjornur merkilega star, er  
 standa nánuar hvor annari, þó á stá, þannig að sú  
 austari er ofar, en sú vestari neðar, og rétt að segja  
 neðan við þá vestari stendur minni stjarna en þriðja;  
 þessar tvær stjornur og hin þriðja minni eru horn-

in á Grútnum. Sú austasta og undirefna effta er annarar stærðar, og heitir Alpha Grútsins, á arabísku Hamal, og er tvíftjarna; sú vestari nedri er þriðju stærðar, heitir Beta Grútsins, eða Scheratan, hin þriðja minsta á ská nedan við Beta, heitir Gamma Grúts, á Arabísku Mesarthim, er hún fjórðu stærðar, og tvíftjarna. Þessar þrjár stjörnur stöðu í beinni línu á ská, ef sú þriðja, Gamma, stöði ekki of nedarlega til þessa. Þetta eru þær stjörnur, er andfenna Grútnum, því varla er á honum neitt merki-legt nema höfundid. Til enn meiri gloggynnar stendur þetta Grúts-höfund á miðri leið milli Sjóstirninsins og stjörnumar Algenib í Pegasus, sjá Leidarvísinsins fyrri deild 29da merki\*) Bilid fyrir vestan Grúts-höfundid allt til Algenib, er Tískamerkid, sem einungis inniheldur smáar stjörnur, verður því Grúts-höfundid andþekkt af því, að það er þær þrjár merkilegustu stjörnurnar miðt á milli Sjóstirninsins og Algenib. Fyrir norðan eða ofan Grúts-höfundid, eru þríhyrningarnir; sjá Lv. f. d. 10da merki og þar fyrir norðan er Almak, á ríft Andromedu, og þar fyrir norðan eru sverdhjolt Persensar, eða Chi Persensar, sem er merkileg stjörnuþyrping, sjá Lv. 1. d. bls. 35. Það er allt því nær í beinni röð, stjörnuþyrpingin Chi, ríft Andromedu Almak, Beta þríhyrninganna (bls. 37) og Alpha Grútsins. Grútnum er máladur liggjandi á vinstri hlið, suyr hann höfðinu að Tískamerki og Pegasus, en apturhluta sín-

\*) Þessi tilvísun verður hér framvegis flamsstofud þannig: Lv. 1. d.

um að Sjóstirninn. A rófu Hrútsins er ein stjarna fjórðu stærðar nokkud nedar ein á þriðjungi vegar frá Sjóstirninn til hrúthöfuðsins og heitir Delta. En svo er þess að geta, að fyrir ofan aptara hluta Hrútsins er litid stjörnumerki, er' heitir Flugan. Hún er milli lærhútu hans og Medúshöfuðsins, líka á milli Sjóstirnisins og þríhyrnunganna, á beinni línu tvo þriðjunga vegar frá Sjóstirni, en einn frá þríhyrnungunum. Dragi menn línu í gegnum þær tvær stóru stjörnurnar á hrúthornunum Beta og Alpha, og haldi stefnunni áfram uppá við til vinstri handar, nær tvöfaldu svo langt, sem er milli Beta og Alpha, þá er komið til Flugunnar. Þær efri tvær stjörnur í þríhyrnungnum Beta og Gamma, benda líka á Fluguna. A Flugunni eru þrjár stjörnur merki-  
legastar. Litla latínuska e er hin nedsta og stærsta, og þriðju stærðar; latínuska a vestan til við hana, þó litid ofar, er fjórðu stærðar; og upp undan þessum báðum stamt eitt, er b, einnig fjórðu stærðar. Flugan er yfirhöfuð að tala, rétt ofan til við miðja þá línu, sem dreigin væri frá Sjóstirninn til Hrúthornanna.

Þi upphafi aldar þessarar 1ta Jan. 1800 voru vorknútsfjarðir og miðbaugsfjarðir þessara stjarna þannig:

		Vorfnúts- sjærd.	Arð- brept- ing.	Midbaugsf. norðlæg.	Arð- brept.
Gamma Grúts					+
Mesarthim . . .	1	stund 43'	3",2	18° 18' 38"	18"
Beta, Scheratan	3	1 — 44	3,3	19 49 32	19"
Alpha, Samal	2	1 — 56	3,3	22 30 40	17,5
a. Flugunnar.	4	2 — 32	3,5	26 50 55	15,8
c. Flugunnar.	3	2 — 38	3,5	26 25 40	15,4
b. Flugunnar.	4	2 — 36	3,5	28 24 52	15,6

Bilji menn eptir þessari toblu útreifna vorfnútsþjærd stjornunnar Samal fyrir árid 1845, þá margfaldast ársbreptingin 3",3 með 45 árum, sem líðin eru frá 1800, þannig með tugabrotum.

45	æða	3,3
3",3		45
<hr/>		<hr/>
135		165
13, 5		132
<hr/>		<hr/>
148",5		148",5

En 148" er sama sem 2' 28", hverjar 2' leggjast við vorfnútsþjærdina 1 stund 56', verður 1 stund 58 mínútur vorfnútsþjærdin 1 Jan. 1845. Þetta er undir eins stjornutíminn þegar Samal er í hásubri. Eptir toblunni í Ev. 1. d. er Sjöstirnib í landsubri þegar stjornutíminn er 1 stund 21 mín., verður svo, þegar þetta er frádreigib:

Háganga Samals . .	1 stund 58'
Sjöstirni i landsubri.	1 — 21'
afgángur	<hr/> 37'
1 strif áttavita	34'

Þessvegna þegar Sjöstirnib er í suburhøllu landsubri, þá er Samal í hásubri. Þess er áður getib að Grúturinn er liggjandi og að høsubib snýr til vest-

urs, eða móti Fískamerki; geingur svo sólbrautin yfir-  
um bringu, fvið og lær Grútsins. En af því þar  
eru annugar merfilegar stjornur, er ekki hægt að sýna  
hvornin sólbrautin liggur þar. Þó vil jeg tilkafa  
það, að hún liggur álíka langt fyrir uedau Mesar-  
thim, sem Mesarthim er langt frá Samal. Liggur  
hún svo þar á ská austur og upp, svo bratt, að hún  
liggur vel fyrir ofan Hyades, er standa i Uramerki,  
og sem seinna verður lýst. Þess er einnig að geta,  
að stjornumerkin i Þyrareiminni standa nú ekki leing-  
ur heima við mældu merkin i sólbrautinni, sem heita  
þó eins, heldur eru stjornumerkin, vegna framfókn-  
innar, vítin svo mjög austur á, eða réttara sagt,  
mælingamerkin i sólbrautinni vítin svo mjög vestur  
á, að nú minnar þetta um heilt sólmerki, líft og áð-  
ur er sagt; þannig er nú á öldum stjornumerkid.  
Grúturinn, hið sama sem mælingarmerkid eða sól-  
merkid Uramerki, og Uramerkid byrjar við Mesarthim  
rétt þar sem stjornumerkid Grúturinn byrjar. Þetta  
femur til af því, að vorfnúturinn færíft alltaf vest-  
urá, hérum 50<sup>u</sup>, 21 árlega i boga, og þegar hvort  
mælt merki er 30° að leingð, mælt frá vorfnútnum,  
þá færíft öll merki sólbrautarinnur eins. Því er  
áður lýst i Lv. 1. d. bls. 65., hvar vorfnúttinn sé  
að finna, nefnil.  $\frac{5}{8}$  bilans milli Algenib og Mar-  
kab, mælt vestur frá Algenib, en eins langt uedar  
enn Algenib, sem Algenib er langt midur frá Sir-  
rah. Þar er það þá, að sólbrautin byrjar, og er því  
sólbrautarinnar Grútsmerki bilid frá vorfnútnum til  
Mesarthim, eða þar midurunðan eins, og áður er sagt.



Pennann fabla sólbrantarinnar geingur sólin frá 21. martii til 21. aprílis, þannig, að hún er þann 21. martii niðurnundan Algenib, en þann 21. aprílis niðurnundan Mesarthim. Aftur á móti er þápunkturinn niðurnundan Algenib, eða vorfúturinn andspænis sólinni þann 24. september, og þápunkturinn niðurnundan Mesarthim, eða upphyrjinn Uramerkis sólarinnar andspænis sólinni þann 24. október. Sjái maður þessa andspænis þápunkta sólarinnar, getur hann farið nærri um hvað framorð er, því ekki þarf annað en ímynda sér að sólin væri þar, sem andspænis þápunkturinn er, enn setja síðan eptirmiddags stund fyrir formiddags stund, og formiddags stund fyrir eptirmiddags stund, þó væri þetta langtíð vissara ef maður hefði sólspjald, sem hallaðist eins og miðhangurinn. Þegar menn sjá tunglið ellegar einhverja jarðstjörnu á því svæði sem er milli vorfútsins og Mesarthim, þá kallast það vera í Þrútsmerki. Tunglið er að miðlúngi  $2\frac{1}{3}$  dags að ganga eitt merki, því það geingur að miðlúngi  $13^{\circ} 10' 35''$  á dag, eða í 24 stundir. En sólin geingur á dag  $0^{\circ} 59' 8''$  að miðlúngi.

## 2. U p i n n.

Þetta stjörnumerki er í minningu þess er Júpíter brá sér í uralíki, þá hann vildi nema burt Eirópu ena fögru, dóttur Algenors kóngs í Fonicin.

Uramerkid innibindur í sér einkum tvær stjörnuþyrpingar Plejades og Hyades. Plejades er Sjöstirnir, er það á hálsi Urans, en Hyades eða Regn stjörnurnar eru flamt austar og nedar á snoppunni,

frá augnum ofan að næsum. A hægra auganu er stór og randleit stjarna á rúnum þriðjungi vegar milli Sjostirnis og Þjósafonanna, hún er fyrsta stærðar, og sú einasta sem svo er stór á þeim vegi. Hún er því kölluð Úrans auga. Alpha Úrans, á arabísku Aldebaran, á latínu Palilicium. Vestan og ofan til við þetta hægra auga, á leið til Sjostirniseins er hið vinstra auga Úrans eða Epsilon Úrans, á arabísku Ain, sem er þriðju stærðar stjarna. Að næs Úrans vestar og niður undan Epsilon, er Gamma, helmingi leiðgra frá augunum, enn er á milli anganna; hún er líka þriðju stærðar. Miðt á milli Gamma og Epsilon eru tvær stjörnur saman, fjórðu stærðar; heita báðar Delta, sú vestari 1 Delta, en hin austari 2 Delta. Þetta er vinstramegin við miðja snoppu. Hinumegin á miðri snoppunni milli Gamma og Alpha eru tvær stjörnur saman fimmtu stærðar, sem heita með sama hætti 1 Peta og 2 Peta. Allar þessar stjörnur, sem nú eru talðar, mynda þann glæsilega þríhyrning, er heitir Hyades, og eru þar líka margar smáar stjörnur á milli hinna stærri sem hér voru talðar. Sjostirnir, Plejades, er líka þríhyrur stjörnuþyrping, suður eitt hornið upp, annað manni í vinstri hönd, hið þriðja, sem er sljóft, horfir til hægri og niður á við. Svö eru margar stjörnur í Sjostirninu að skiptir hundrudum. Eptir goðafræðinni eru þar 7 dætur Atlasar og Plejone, og foreldrarnir líka. Foreldrarnir eru í austurhorninu: 1 Atlas ofar, og 1 Plejone nedar. Hann er sjöttu stærðar, en hún áttundu. 3 vesturhlidinni eru

g Celesto (7), í vesturhorninu neðra er h Electra (5), þar næst í neðstu hlíðinni d Merope (5). Þar fyrir austan er Eta Alcyone (3), hún langstærsta í Sjöstirninni. Fyrir austan og ofan Celeno er e Taygeta fimmtu stærðar. Austan og neðan hana er e Maja sjöttu stærðar. Í efsta horninu eru tvær stjörnur k og l, og heita báðar Asterope, báðar sjöundu stærðar. Fyrir utan Hyades og Plejades eru í Uranum merkilegastar stjörnur þær er standa ytt á hornum Urans, kalladar Urahorn, þær standa austan og ofan Hyades, dálitð leingra frá augum Urans ein Aldebaran er frá Sjöstirninni. Þvíð efra eða vinstri hornið heitir Beta Urans, á arabísku Rath og er annarar stærðar. Þetta er sama stjarnan sem Gamma Osmaunnsins eða hægri fótur hans, sjá Ev. 1 d. bls. 38. Aldstjarnan á hægri horninu stendur þar nærri niðurbundan, þó litill anstær, heitir hún Zeta Urans, og er þriðju stærðar. Vestan og ofan þessa stjörnu orskamt, er ein stjörnuþoka. Urahornin Beta og Zeta eru hinar stærstu stjörnur á þessum himinsvæði austur og upp undan Hyades. Séð dregin lína í gegnum Gamma og Alpha Urans, og henni haldbíð áfram til vinstri, nær 4 sinnum svo langan veg frá Alpha, sem Alpha er frá Gamma, þá er komið að neðra Urahorninu Zeta. Þitt hornið Beta er skamt þar fyrir ofan, og er svæði þetta nærri uppundan Fjósakonunnar, eða réttara sagt geingur í háfudur nærri því undireins og sú vestasta í Fjósakonunni. Af Uranum er ekki máláð nema hofudid, hornin, trausturur og hálsinn. Hann liggur á framfótum

um hálfreptum, horfir til austurs, setur undir sig höfuðid, beitir fram hornunum eða stánga þeim til austurs móti Tvíburunum.

Í byrjun aldar þessarar voru vorfnútsfjarðir og miðbaugsfjarðir hinna merkilegustu stjarna í Ur-  
anum þessar:

		Vorfnúts- fjard.	Ur- breyt- ing.	Miðbaugsf. norðlæg.	Ur- breyt. +
Eta Alkyone .	3	3 stund 36'	3",5	23° 28' 38"	11" 8
Gamma Urans	3	4 — 8	3, 3	15 8 3	9" 4
Epsilon Min .	4	4 — 17	3, 5	18 43 27	8, 7
Alpha Aldebaran	1	4 — 24	3, 4	16 5 42	8, 1
Beta . . . . .	2	5 — 14	3, 8	28 25 27	4, 0
Zeta . . . . .	34	5 — 26	3, 5	21 0 27	3, 0

Vorfnútsfjard stjornunnar Aldebaran eykst árlega 3",4; margfaldist það með 45 þannig:

$$\begin{array}{r}
 45 \\
 3,4 \\
 \hline
 180 \\
 135 \\
 \hline
 143,0
 \end{array}$$

Þá kemur 143" eða 2' 23", sem lagt við vor-  
fnútsfjardina 1800, gefur 4 st. 26', sem er vor-  
fnútsfjardin 1845 eða stjornutíminn, þegar Urans  
hægra auga hágeingur. Þá er

hágangi Aldebaran 4 stund. 26'

Sjóstirni í súdri 3 — 38

$$\begin{array}{r}
 48' \\
 1 \text{ strif áttavita} \quad 34 \\
 \hline
 14
 \end{array}$$

Sjóstirnid er þá nær 1½ strif á áttavitaunum komið úr súdri, þegar Aldebaran er í háfúðri. Sjö-

stirnid er þá á milli vesturhalls sudurs og sudur útsudurs.

Í gegnum Uramerkið geingur sólbrautinu austur og upp mitt á milli Sjöstirnisins og Regustjarnanna. Þessi er getið, að sá mældi Hrútur eða Hrútsmerki í sólbrautiinni endabi fyrir undan Mesarthim, tefur þá Uramerki sólbrautariunar við, og nær svo langt austureptir, uns komið er rétt mitt á milli Sjöstirnisins og Delta Uraus; byrjar þar svo Tviburamerki sólbrautariunar. Í þessum þúnkti mitt á milli Sjöstirnisins og Delta er sól in þann 21ta eða 22 maí, svo að frá 21ta apríl til 22 maí er sólin í Uramerki. Þar á móti frá 24 okt. til 23 nóv. er þessi kaðli andspænis sólinni, og þann 20 nóv. er Sjöstirnid rétt andspænis sólinni, svo þann dag er eins framorðið á sólinni eins og á Sjöstirninu; t. d. ef Sjöstirnid er í fl. 9 stad fyrir middeg, þá er á sólinni fl. 9 eptir middeg. Þann 30 nóv. er Uraus hægra anga með sama hætti andspænis sólinni og má því eins sjá af því hvað framorðið er.

### 3. T v í b u r a r n i r.

Þessir Tviburar áttu fyrst að vera Apollo og Hercules, en seinna merktu þeir Castor og Pollux, er vegna bæðraástar sinna voru settir á himininn.

Rúmlega hálfri fjórðu stund eptir Sjöstirninu, en tveim stundum á eptir Þjóðakonunum, standa tvær stjornur góðum mun hærra á himni enn Sjöstirnid. Þær eru hinar merkilegustu á því svæði, eru jafu-

stórat, og rétt nærri hvor annari, og standa á ská, sú fremri ofar, og hin aptari neðar; heitir sú efri, eða fremri Castor, hin neðri eða aptari Pollúr. Castor stendur á enni tvíburanna Castor, og Pollúr á hægri fimm tvíburanna Pollúr. Þessar stjörnur eru annarar stærðar. Þegar Sjóstirnið er í súðri, þá eru Castor og Pollúr nærjeldt í austurlandsúðri. Þegar Flugan er í hájndri, þá er Castor og Pollúr í háanstri, og stendur þá Castor rétt að segja uppundan Pollúr. Dragi meint línu gegnum Staupmannastjörnuna (Capella) og í gegnum Mentalinan í Ofumanni (sjá bls. 37. Lv. 1 d.) og haldi henni áfram til vinstri nálægt 3 sinnum svo löngan veg sem er á milli Capellu og Mentalinan, þá er komið ofantil við Castor. Ofantil við Fjösaflonurnar standa tvær stjörnur stórar, af hvorjum sú aptari heitir Beteigenze; verður frá henni sagt betur síðar, þegar lýsa skal Drioni. Sé nú dregin lína frá vestustu Fjösaflonunni í gegnum Beteigenze, og henni haldið áfram svo sem 3 til 4 sinnum svo löngan veg sem þannu eð er milli Fjösaflonunnar og Beteigenze, þá er komið nálægt Castor. Castor er tví stjarna og nefnist öðru nafni Alpha Tvíburanna. Pollúr heitir Beta Tvíburanna. Á ráðum þriðjungi vegar frá Beteigenze til Pollúr er stjarna þriðju stærðar, Gamma Tvíburanna, á vinstri fótur tām tvíburans Pollúr; heitir hún á arabísku Alhena. Á sömu stefnum frá Beteigenze til Pollúr á lokum  $\frac{2}{3}$  vegar, er stjarna fjórðu stærðar, sem heitir Zeta Tvíburanna, á arabísku Mekbuda, á vinstri kné á Pollúr. Einn nú í sömu

stefnu til Pollúr er stjarna fjórðu stærðar, sem heitir Delta Twiburanna, á arabísku Wasat, á hægri framhandleggi Castors. Á Twiburanna fjórum riftum standa fjórar stjörnur í röð; á Castors vinstri og hægri rift er My (3) og Ny (4), á Pollúrar vinstri og hægri rift er Gamma (3) og Xi (4). Þessi stjörnuroð hallast eða stendur álíka skáhallt sem stóru stjörnurnar Castor og Pollúr, því Twiburarnir sitja bróðurlega hvörr hjá öðrum; eru svo fjórar riftarnar í röð, og knén eins. Á Castors vinstri kné er stjarna (3) er heitir Epsilon, á arabísku Mebsuta, hún er tví stjarna. My Twiburanna heitir á arabísku Tejat en síðari; því orskamt á undan henni er stjarna (4) er heitir Tejat en fyrri, eða Eta Twiburanna. Skamt á undan báðum Tejat, lítið leiugra frá þeim einu milli þeirra er, stendur lítil stjarna 5tu stærðar, er heitir H Twiburanna, en á grísku Propús, væntanlega af því hún er rétt framantil við vinstri fótinn á Castori. Þar var það, að Herschel fyrst fann jarðstjörnuna Uranus, þann 13. martii 1781; sýndist hún með beru auga vera stjarna sjöundu stærðar, en í sjónpípu hans varð hún stærri en nokkur stjarna fyrstu stærðar. Ekki var þessi sjónpípa hans samt sú hin mikla. En þessi óvænta stærkun varð orsök til þess, að hann fór að veita henni meiri eptirtekt.

Þorknúts og midbaugesfjærdir hinna markverðustu stjarna í Twiburannum, í byrjun þessarar aldar, voru :

	Vorknúts- sjærd.	Árs- breyt- ing.	Míðbaugsf.	Árs- breyt.
Tejat fyrri. Eta 4	6 stund 3'	3",6	22° 33' 17"	0",2
Tejat seinni. My 3	6 — 11	3, 6	22 36	0, 9
Uy . . . . . 45	6 — 17	3, 5	20 20	1, 5
Alhena Gamma 3	6 — 26	3, 4	16 33	2, 3
Mebfuta Epsilon 3	6 — 32	3, 7	25 19	2, 7
Xi . . . . . 4	6 — 34	3, 4	13 6	3, 0
Mefbuda Zeta 4	6 — 52	3, 5	20 51	4, 5
Wasat Delta . . 4	7 — 8	3, 5	22 20	5, 9
Castor. Alpha 2	7 — 22	3, 8	32 19	7, 0
Pollúr. Beta . 2	7 — 33	3, 7	28 30	7, 9

Teikuid —, (Minus) fyrir ofan ársbreytingar miðbaugssjærdanna, merkir að þær eigi að frádragast eptir 1800, eða að miðbaugssjærdin fari minskandi; t. a. m. ár 1845 eru 45 ár lidin frá albar byrjun, þá segi jeg: 45 sinnum 7" er 315" eða 5'; þessar 5' dragast frá 32° 19' kemur 32° 14' svo, nú er miðbaugssjærdin 32° 14' til norðurs; þannig ferist Castor allt af suður á við. Árið 1845 er vorknútssjærd Castors 7 ft. 25' sem lífa er stjörnutíminn þegar Castor er í háfudri.

Háganga Castors . . 7 ft. 25'

Sjóstirni í útsudri . 5 — 55

1 ft. 30' = 90'

2 stífr áttavita . . . . . 88

2'

Sjóstirnið er því í vesturútsudri þegar Castor er í háfudri.

Til að gjöra sér myndan um hyrnuin sólbrant- in gáugi í gegnum Tviburamerkið, þá liggur hún ofantil við Propús eða H Tviburanna, því þessi stjarna hefir einungis 0° 12' 50" sublaegrar breidd-



ar. En breidd stjörnu fallast hennar fjarlægð frá sólbrautinni, hvort sem er til norðurs eða suðurs. Leingd stjörnuunnar þar á mót heitir bogi sá af sólbrautinni, sem byrjar við vorknútt og endar við stjörnuunnar breiddarboga (breiddina sjálfa) sem ætíð stendur lóðrétt á sólbrautinni. Þessi leingd og breidd stjörnuunnar eru híd sama sem í Ursíus stjörnufræðinefnið jarðmíðjuleingd og jarðmíðjubreidd bls. 81 en má ekki sleingjast saman við stadanna leingd og breidd bls. 182. Leingd og breidd stjörnu eru mjög líkar vorknútsfjærd og mibbaugsfjærd. Vorknútsfjærd mætist á mibbaug, leingdin á sólbraut, báðar frá vorknútt; vorknútsfjærdin mælist til mibbaugsfjærdahringus stjörnuunnar, hvor hringur að stendur lóðrétt á mibbaug og geingur í gegnum jarðmoubla báða. Leingdin mælist til stjörnuunnar breiddarbaugs, er stendur lóðrétt á sólbraut, og geingur í gegnum sólbrautar-moubla báða. Mibbaugsfjærdin mælist á mibbaugsfjærdahringnum frá mibbaugi til stjörnuunnar. Breiddin mælist á breiddahringnum frá sólbraut til stjörnuunnar.

Jeg vék frá því áðan, að jeg sagði að sólbrautin lægi rétt ofantil við Þrópus, þar liggur hún rétt til austurs og hækkar ekki til muna, en fyrir ofan Tejat ena fremri eða Eta Tviburauna, þá er hún uppá sitt hæsta, og er þar sumarsólstaðapunkturinn og uppbyrjunin á Krabbamerki sólbrautarinnar. Síðan fer sólbrautin að lækka eptir sem austureptir dregur, og geingur í gegnum Wasat eða Delta Tviburanna. Við mælða Tviburamerki í sólbrautinni byrjar því eins og af áðursögðu má skil-

ja, við þúkt þann, sem er mitt á milli Sjóstirnissins og Delta Urans, hvar sólín er þann 22. maí, en endar við Tejat ena fremri, hvar sólín er þann 22. júní á sólstöðum. Leingð stjörnuunnar Wasat eða Delta Lyburanna er 3 s.  $16^{\circ}$ , það er 3 Signa  $16$  gráður eða 3 merki  $16$  gráður, og þýðir það, að Wasat standi þar sem  $16$  gráður eru mældar af Krabbamerki sólbrantariunnar. Þessa leingð hefur sólín þann 9. júlí, svo að þann dag geingur sólín fyrir Wasat. Breidd Wasats er  $0^{\circ} 13'$  til suðurs. Þann dag er sólarkringlunnar hálfí þvermælini  $15' 47''$ , og sólarmitjan geingur rétt á sólbrantinni; það er því hérumbil 2 mínútur af sólariunnar syðri rend sem ganga fyrir Wasat. En þetta er, eins og allir vita, ómögulegt að sjá vegna sólarbirtunnar. Þar á móti er Wasat merkilegri þegar hún er andspænis þúktur sólariunnar, og er það þegar leingð sólariunnar er 6 merkjunni meiri enn Wasat leingð, nefnilega 9 s.  $16^{\circ}$ , það er, þegar sólín hefur geingid  $16$  gráður af Steingeitarkerki, og er það þann 7. jan. Leingð stjörnuunnar Tejat hinna fremri eða Eta Lyburanna er 3 s.  $0^{\circ} 39' 7''$  ár 1800; og þar hún, eins og allar fyrðarstjörnur, færast árlega eptir leingðinni  $50'',21$ , þá gjörir það í 45 ár  $37' 45''$ , svo að leingðin þessara stjörnu er ár 1845 orðin 3 s.  $1^{\circ} 16' 52''$ , er því stjarnan orðin rúmri  $1^{\circ}$  austar en sumarsólstaðapúntturinn. Breidd stjörnu þessara er  $0^{\circ} 55' 50''$  til suðurs; en breiddin stjarnanna stendur alltaf í stað, því þær færast sífellt samtíða sólbrantinni. Sólbrantinn er því nærri

1<sup>o</sup> ofar einn Lejat, og einni gráðu vestur þar frá er sumarsólstodupunkturinn. Leingd þess punkts er 3 s. eða 90°, breiddin er 0° 0' 0", vorfnútsfjærdin 90° í boga, en 6 stundir í tíð, því 15 í 90° er 6 sinnum, sambr Ev. 1 d. bls. 9. Miðbaugsfjærdin þess punkts er 23° 27' 53" árið 1800, en 1845 er hún 23° 27' 30",5, og minskar árlega  $\frac{1}{2}$  sekúndu hérumbil. Í gegnum þennan reit geingur lífa sól-  
hvarfakubbbhringurinn (Colurus solstitialis) sjá Ev. 1 d. bls. 30. Hann geingur bæði í gegnum sólbrantarmondla og lífa jarðmondla. Þegar sumarsólstada reiturinn er í hásubri, þá er sólbrautarmondullinn nyrðri rétt miduruðan jarðmondli 23° 27' 30",5 rétt eins og miðbaugsfjærd sumar sólhvarfapunktsins er, eða fjarlægð sólhvarfareitsins frá miðbaugi; þetta er sama sem sólbrautarhallinn eða glenningur sá sem sólbrautin glennist frá miðbaugi. Því miðbaugur og sólbrant liggja hvert í gegnum annað álist og rifin á býraboga eða hlírar á rafgrind, meðan verid er að spenna út, en ekki eins og þegar búid er að spenna út. Miðbaugur og sólbrant liggja hvert í gegnum annað, eins og hjálkar á látinsku upphafs X, hvar ás eða samkomupunktur hjálkanna sýnir báða jafudægrapunktana, er bera hvor í annan, en opin bæði við endana merkja miðbaugsfjærdirnar við sólhvarfareitina. Þringarnir báðir líta út sem beinar línur, þegar horft er á rondina á þeim.

## 4. K r a b b i n n.

Þín látinstu og grísku stáld segja að Júpíter hafi sett krabbann meðal stjarnanna. Sólin hækkar ekki frammar, heldur geingur út á hlið, krabbagang. Krabbamerkið hefur einungis sínástjörnur, stærstar fjórðu stærðar. Sé bregin lína í gegnum Castor og Pollús, og henni halbid niður á við, nærri 5 sinnum svo lángan veg, sem er milli Castor og Pollús, þá er komið að stjornunni Beta Krabbans (4) á optustu suburfló. Þar austur undan, litid hærra, standa tvær stjörnur saman (4), heita þær Alpha Krabbans, og skamt austar er Skappa Krabbans (4). Alpha stendur á suburtaung Krabbans. Vestur og uppundan henni standa tvær stjörnur hvor upp undan annari; Gamma sú efri, Delta hin nedri, heita líka sá Myrdri-og Sybri-Asni, báðar fjórðu stærðar. Milli þeirra ermerki-  
leg stjörnuþyrping litil, er heitir Jatan eða Stallurinn. Henuar er getið í Stjörnufræðinni bls. 153, og getur samilega góður lífir greiðt þessa stjörnuþyrpingu í gloggvar stjörnur. A latínu heitir hún Præsepe. A rúmum þridjúngi vegar frá Pollús til Norður-Asnans er stjarna (4) er heitir Psi Krabbans, á hans aptari norðurflóm. Þorknúts og mid-  
baugsfjærðir hinna helztu stjarna í Krabbannum eru þessar:

		Þorfnúts- fjærd.		Mibbaugesj.	
Beta . . . . .	4	8 stund 6'	3 <sup>u</sup> , 3	9 <sup>o</sup> 48'	10 <sup>u</sup> 4
Epiloni Jotunni	7	8 — 29	3, 4	20 15	12, 1
Nordur-Alsninn		8 — 32	3, 5	22 11	12, 3
Sudur-Alsninn		8 — 33	3, 4	18 53	12, 4
Sudur-taung		8 — 48	3, 3	12 37	13, 4

Af þessari tobla má sjá, að Jatan er í háfubri 20 mínútum fyrr enn Efestirnib kemst í fullt vestur. Teiknib — yfir ársbreytingu mibbaugesfjærdanna segir, að Mibbaugesfjærdinnar fari minfandi. Mennt geta lifa vitab það fyrirfram, án þess teiknib hér stæðiz; því þegar stjarnan stendur þar norðurnundan eða súðurnundan hvar sólbrautinn fer læffandi, þá fer stjarnan lifa læffandi, eða geingur súður á við, vegna þess hún við fræmsökunina geingur allaf samfíða sólbrantinni. Með þessari reglu má bæta úr því, að í 1. parti þessa Teibarvísis hefur gleymst við Cepheus og víðar, að geta þess, að ársfærslan í mibbaugesfjærdunum geingi norður á, eða þar ætti að standa +, hvað eb, er þessvegna, að sólbrautinn, sem þar geingur í gegnum Vatnsberamerki, hæffar sig þar, eða geingur til landnordurs. Þessa hæffun og læffun sólbrautarinnar má lifa sjá á vorfnútsfjærdinni, því fyrstu 6 stundirnar fer hún hæffandi, aðrar 6 stundirnar fer hún læffandi; þriðju 6 stundirnar fer hún lifa læffandi; og fjórðu 6 stundirnar fer hún hæffandi. Þorfnútsfjærdinnar blf. 24, Ev. 1 b. eru 21 stund; og er það í kabla hinna fjórðu 6 fluffustunda; fyrir það er færslan þar norður á. Þar á móti færst Arcturus súður á, 1

part. bls. 21, hvar vorfnútsfjærdin er 14 stundir, sem er í þriðju 6 stunda kaflanum. Eins er Gimsteinninn bls. 46, hvar vorfnútsfjærdin er 15 stundir, sem er í þriðja kaflanum.

Þessi er áður getid í Tvíbúramerki, að sólbrantinn geingur nærfelt í gegnum Vafat eða Delta í Tvíbúramerki þann 9. júlí. Þaðan geingur sólbrantinn sudur á eða lækkandi, og geingur nærri í gegnum Sudur=Asnann. Leingd hans var á næstu aldamótum 4 s. 5<sup>o</sup> 55' eða 5 gráður 55 mínútur af Ljóni; breidd 0<sup>o</sup> 3' 51" norður á eða norðan sólbraut; þar er sólin þann 29. júlí, geingur þá Sudur=Asnann nokkud ofar enn í gegnum miðja sól. Þann 26. janúarí þar á móti stendur þessi Asni gagnvart sólu. Þessi er áður getid, að Krabbamerki sólbrantariunnar byrji fyrir vestan Tejat; en til að sjá hérumbil hvar Krabbamerkið endar, en Ljónsmerkið byrjar, þá má skipta bilinu milli Vafat og Sudur=Asnans í 4 jafna parta, telja þrjá af þeim frá Vafat og einn til Asnans, þar endar Krabbamerkið, en byrjar Ljónsmerkið, hvar fjórðungur bilsins er eptir til Asnans. Sólin geingur inn í Ljónsmerkið þann 23. júlí. Þann 20. jan. er sólin andspænis Ljónsins byrjun. Sjái menn því tunglið eða pláneturnar á þessu bili frá Tejat til  $\frac{3}{4}$  frá Vafat til Asnans, þá er tunglið eða jarðstjarnan í Krabbamerki.

## 5. L j ó n i d.

Ljón þetta á að vera ljónið mikla, er Herkúl-

les drap hjá borginni Nemea, og sem Jánó setti á medal stjarnanna.

Þetta glæsilega merki, Ljónid, hefur í sér margar hjartar stjornur, en stærust allra er þar Regulus, eða Ljónshjartad, eða Alpha Ljónsins. Þegar Blástjarnan er hérumbil í landnordri, og Sjostirnid nálægt vesturútnordri, Uxans auga í vestri, og Pollús nærri í útsudri, þá er Regulus í háfudri. Þessi stjarna er fyrsta stærðar. Sé dregin lína frá Delta í gegnum Gamma og Psi Stóra-Bjarnarins hittir hún, áframhaldin, Regulus, en geingur þó áður í gegnum Gamma Ljónsins, stjornu annarar stærðar, sem heitir á arabísku Algiebra. Þessi Gamma er lítið austar enn rétt upp undan Regulus, þegar hann er í sudri. Fyrir ofan Gamma er Beta, en neðan Gamma er Eta Ljónsins. Beta er þriðju stærðar en Eta fjórðu. Sumir láta Zetu vera fjórðu eða fimmtu stærðar, en Etn þriðju eða fjórðu. Þessar stjornur eru á hálsi Ljónsins. Vestur undan Beta er skafferhyrningur My (4) Epsilon (4) Lambda, (4) og Rappa, (4) á hofdi og kjamma Ljónsins. Þær austari báðar hafa arabísk nöfn. My heitir Nasalasab nyrðri, og Epsilon Nasalasab syðri. Drött eða rétt hjá Regulus er Ny Ljónsins (4), svo leingra vestur og niður Omikron (4) og Xi (4), á hronnum Ljónsins eða framflónum. Fyrir austan Regulus og stjornurnar á hálsi Ljónsins, stendur að mestu rétthyrndur þríhyrningur: Delta (3), Peta (3) og Beta (1) eða (2). Sú austasta Beta, á hala Ljónsins, heitir Denebola. Peta stendur á mjóðm Ljóns-

ins og heitir á látinu Coxa; hún er nærri rétt vestur undan Denebola, þó heldur ofar, þegar í súðri er. Delta heitir Zosma, og stendur nærri upp undan Coxa. Fyrir nedan Coxa standa nokkurnveg in í röð austurhallt Jöta (4) og Ypsilon (4) á apturfótum Ljónsins, og fyrir vestan og nedan Ypsilon er e (4) og Phi (4) á apturflóm. Stamt austan og nedan Regulus á leið til Tau, er Rho (4), og nær þrem sinnum svo langt aptur frá Regulus, sem Ró er fyrir vestan hann. Þær 4 stjörnur: Alpha Beta, Gamma og Delta mynda hjartan ferhyrning, gjöra þær Ljónid einkum auðþekkjanlegt á sinu svæði. Þær merkilegustu stjörnur í Ljóninu, höfðu við aldamótin þessar vor-  
knúts- og midbaugs fjærdir:



		Borfnúts- fjard.	Þræ- breyt- ing.	Mibbf.	Þræ- breyt.
Kappa . . . . .	4	9 stund 13'	3,5	+ 27° 2	14,9
Epsilon Kasala- sad sydri . . . . .	4	9 — 34	3,4	24 41	16,1
Lambda . . . . .	4	9 — 20	3,4	23 51	15,3
My Kasalasad nyrdri. . . . .	4	9 — 41	3,4	26 57	16,5
Ny . . . . .	4	9 — 47	3,2	13 24	16,8
Eta . . . . .	4	9 — 56	3,3	17 44	17,2
Alpha Regulus. 1	9	— 58	3,2	12 56	17,2
Zeta . . . . .	3	10 — 6	3,3	24 25	17,6
Gamma Algieb- ra . . . . .	2	10 — 9	3,3	20 51	17,7
Rho . . . . .	4	10 — 22	3,2	10 20	18,2
Delta Jofhua . . . . .	3	11 — 3	3,2	21 37	19,4
Peta Coza . . . . .	3	11 — 4	3,1	16 31	19,4
Phi . . . . .	4	11 — 6	3,0	— 2 34	+ 19,5
Jota . . . . .	4	11 — 13	3,1	11 38	19,6
Tau . . . . .	4	11 — 18	3,1	3 57	19,7
e . . . . .	4	11 — 20	3,0	— 1 54	+ 19,7
Ypsilon . . . . .	4	11 — 27	3,1	+ 0 17	— 19,8
Beta Denebola . 2	11	— 39	3,0	+ 15 41	19,9

Þessi er hér að geta að við Phi og e Þjónsins eru miðbaugsfjærdirnar sublæggar, og breytingar þeirra eru additívæ, þ: e: eiga að leggjast við þær sublæggu miðbaugsfjærdir, því stjornur þessar færaft sudurá í framtíðinni, eins og sjá má á því hvornin sólbrautin hallast sudurá. En hvornin hún liggur sudurá í gegnum Þjónsmerkid, verður hægt að sjá á himninum, því hún liggur frá Sudur=Asnauum nær því í gegnum Ny Þjónsins, svo í gegnum Regulus, svo í gegnum Rho og seinast Tau; er þá skamt eptir til haustjafubægra þúnktsins eða haustfnútarins, því Ypsilon Þjónsins er nærri í miðbang. Vilji maður sjá hvornin þessar stjornur liggja við sólbrantinni

þá sýnir það þessi litla table yfir leingd og breiddir þeirra:

	Leingd.	Breidd.	Sólstefnu- tid.	Jardstefnu eða andstödu- tid.
Uy Ljónsins	4 s. 24° 33'	0° 2' n.	18. aug.	13. febr.
Regulus . . .	4 27 3	0° 28' n.	21. aug.	16. febr.
Rho Ljónsins	5 s. 3 36	0° 9' n.	27. aug.	21. febr.
Tau Ljónsins	5 s. 18° 43'	0° 34' s.	11. sept.	9. martá.

Þar sem hér i leingdardálknum stendur 4 s. þá þýðir það að 4 Signa eða merki séu fullgeingin, og að stjarnan sé þessvegna i Ljóni, sem er hið 5ta merki. Sömulcibis merkir 5 s. að 5 merki séu fullgeingin og stjarnan sé i himi sjötta, sem er Jómfrúin eða Meyarmerki. Yfirhofud i leingdarreikningum kallast Þráturinn 0 s. Urinn 1 s. Tvíburar 2 s. Krabbinn 3 s. Ljónid 4 s. Meyin 5 s. Metin 6 s. Sporddrekinn 7 s. Bogmadurinn 8 s. Steingeitin 9 s. Vatnsberinn 10 s. Fiskarnir 11 s. Þessar hér leingdir teldu gyltu fyrir 1 jan. 1800, en vara árlega 50" 21 vegna framfórnarinnar. Bókstafurinn u. aptan við breiddirnar, merkir, að þær séu norðlægur, og að sólbrantinn liggi þessvegna fyrir sunnan þær stjornur. Þar á móti þýðir s. að breiddin sé súðlæg, og þessvegna sólbrantinn þar fyrir norðan stjornuna. Breiddin stendur alltaf i stad, svo ekki þarf að bæta við hana eða taka frá fyrir árin sem líbin eru frá 1800. Sólstefnutidirnar segja til hvenær sólin gangi fyrir þessar stjornur; Jardstefnu eða andstöðutidirnar segja til hvenær þessar stjornur eru andspænisþúnktar sólariinnar. Um sólstefnu

er talad í Stjörnufræðinni bls. 25 og 37. Líka er bls. 37 talad um jarðstefnu, eða sem líka má kalla andstöðu stjörnu og sólar. Af breidd Regulusar 29' n. má sjá að sólin geingur aldrei rett fyrir Regulus, heldur geingur sólin ætíð fyrir sunnan Regulus, svo að 12' verða á milli; því sólarinnar hálfí þvermálir er 16'. Af leingduunum Regulusar og Rho Ejdusius má sjá, að hérum mitt á milli Regulus og Rho eudar Ejdusmerkíð í sólbrautinni, og byrjar Meyarmerkíð. Þar er sólin þann 23. aug., en andspánis sólinni er sá reitur þann 19. febr.

## 6. M e y í n.

Músar eru meiningar um hvor mey þessi hafi verið. Eftir sumra sögu er það Ceres, uppstérugydja Gríffja; eftir annara sögu, er það Ísís, helgud brottning Egiptas; einnig á það að vera Astræa réttlætisgyðjan, og lofsins á það vera Erigone, dóttir Íkarus kóngs í Rakedæmoni. Meyarmerkíð kemur næst fyrir austan Ejdúð, og er í því ein stjarna fyrstu stærðar, er heitir Spica eða Ar, einnig kallað Azimech. Sá sem þekkir Arcturus og Denebolu í Nautamanni og Ejdú, þann getur leitað að Meyar-arnum sudur frá báðum þeim stjörnum þannig að verði nær jafnhliða þríhyrningur milli Arcturus, Denebolu og Azimech. Þetta Meyar-ar má líka finna, með því að draga línu frá Neffar eða Beta Nautamannsins til Arcturus (sjá bls. 40 Ev. 1 d.) og halda þeirri stefnu til sudurs. Meyin liggur á vinstri hlið, suður hofdi

finnu til vestrar, fótum til austur, heldur svo á Arinu með vinstri hendi fyrir uðan vinstra kné. Mey þessi er ólík öðrum meyum í því, að hún hefur vængi. Tafi menn sér stefnu í gegnum Eta, Tau og Ipsilon á vinstra eða vestara fæti Nautamanns, og haldi henni á fram, þó svo að Eta og Tau ráði heldur stefnunni enn Ipsilon, þá kemur hin næsta stjarna þriðju stærðar á efra eða hægri væng Meyarinnar, er heitir Epsilon eða Binde-miatrix (sú vinuþpfferandi). Þegar hún er í súdri, þá er Pol-lúr lítt geinginn úr vestri, Aldebaran hér um bil undirgeinginn í útnordri, Sjostirnir í norðurhollu útnordri og Blástjarnan í norðurhollu austri. Sé áður umgetinni stefnu áfram haldb, það er að skilja, frá Nautamanns fæti til Binde-miatrix, ellegar máfke, sem andveldara er, sé tekin stefna frá Arcturus í gegnum Binde-miatrix, og henni áfram haldb álíka langt frá Binde-miatrix, sem Binde-miatrix er frá Arcturus, þá er komib að stjornu þriðju stærðar, Beta, á framhorninu á Mey-arinnar vinstri eða uðra væng; sú stjarna er og rétt nibur undan Denebolu, þegar í súdri er, og heitir á arabísku Zavijava. Austur frá þessari Zavijava, nokkub ofar enn á stefnu til Spica er Eta (3) Gamma (3) tvíftjarna, og Peta (4) á uðra vængunni austureptir. Stjarnan Peta er á vinstri hendi meyarinnar. Sakri einni stundu á eptir Arinu eru tvær stjornir fjórðu stærðar, Rappa ofar og Lambda nedar, og er skamt milli þeirra; þessar eru á vinstri eða uðra fæti mey-

árinnar. Fyrir ofan þessar er Jóta (4) og þar fyrir ofan Phi (4). Þessar eru á fatbriddingu meyarinnar. Á hægri fæti austur frá Jóta er My (4). Fyrir ofan Arid, en austur undan Eta og Gamma, er Zeta (3). Þessar stjörnur Eta Gamma og Zeta eru nærfelt í miðbaug. Á milli Vindemiatrix og Gamma er Delta á brjósti meyarinnar (3). Þessar stjörnur: Vindemiatrix, Delta og Gamma eru að mestu í röð, eða Delta og Gamma eru að mestu niður undan Vindemiatrix; þó er Delta lítið vestar og Gamma einu vestar. Vorknúts og Miðbaugsfjarðirnar þessara stjarna voru árid 1800 þannig:

		Vorknúts- fjard.		Miðbaugs- fjard	
Javijava Beta . . . . .	3	11 stund 40'	3,1	+ 2° 54'	— 19,9
Eta . . . . .	3	12 — 10	3,1	+ 0 27	— 20,
Gamma . . . . .	3	12 — 32	3,1	— 0 21	+ 19,8
Delta . . . . .	3	12 — 46	3,0	+ 4 29	— 19,6
Vindemiatrix Ep- silon . . . . .	3	12 — 52	3,0	— 12 2	— 19,5
Peta . . . . .	4	13 — 0	3,1	— 4 28	+ 19,3
Upsilon Alpha . . . . .	1	13 — 15	3,1	— 10 7	+ 19,0
Zeta . . . . .	3	13 — 24	3,1	+ 4 26	+ 18,7
Rappa . . . . .	4	14 — 2	3,2	— 9 20	+ 17,2
Jóta . . . . .	4	14 — 6	3,1	— 5 2	+ 17,1
Lambda . . . . .	4	14 — 8	3,2	— 12 26	+ 17,0

Í miðbaugsfjardum þessum segja teiknin + og — hvort stjarnan er fyrir norðan eða suðan miðbaug. Í ársbreytingunum miðbaugsfjardanna færast hér allar stjörnurnar suðurá; þess vegna dragast þær frá, ef miðbaugsfjardin er norðlæg, og stendur þá — í ársbreytingunni. Þar á móti leggjast þær við, ef Miðbaugsfjardin er suðlæg, og stendur þá + í Ársbreytingunni. Í Þessari töflu

má sjá hvað nærri þær næstu stjornur Eta, Gamma og Zeta eru miðbaugi, svo menn geta, þegar þeir sjá þessar stjornur, gjort sér myndun um legu miðbangs um Meyarmerkið. Þar á móti má gjöra sér myndun um legu sólbrautarinnar yfirum Meyarmerkið þegar maður sér Tau Ejsónsins, Zavijava, Eta Meyarinnar, Peta, Arid, og Lambda Meyarinnar og nokkud stóra stjornu, annarar stærðar, í Metastálamerki, er heitir Klíffa hin syðri, eða Syðri-Skálin. Þetta má sjá á eftirfylgjandi töflu yfir leingdir og breiddir þessara stjarna í Meyarmerkinu.

	Leingd.	Breidd.
Beta Zavijava . . . . .	5 s. 24° 18'	+ 0° 41'
Eta . . . . .	6    1    47	+ 1    12
Peta . . . . .	6    15    27	+ 1    46
Azimech. Alpha . . . . .	6    21    3	— 2    2
Lambda . . . . .	7    4    9	+ 0    32

Af þessu töfluformi sést að Arid er talðvert fyrir summan sólbraut, rúmar tvær gráður, en húnar stjornurnar eru allar fyrir norðan sólbraut. Af töflunni má líka sjá, að Meyarmerki sólbrautarinnar endar 1° 47', fyrir vestan Eta; tekur þá Metastálamerkið við; þó gyldir þetta rannar í byrjun 19du aldar, verður því að leggja 50",21 við fyrir hvert ár sem líðið er af öldinni. Eta stendur því í Metastálamerki sólbrautarinnar, þó hún standi í Meyarmerki býrareimarnar. Hausstnúturinn eða hausstjafudægrareiturinn er því 1° 47' vestar enn Eta í sólbrantinni, en 2° 25' á miðbaugi, þó er hann líka 27' nedar enn Eta, hvað ed sjá má af miðbangsfjærdinni. Í honum er sólin þann 23. sept.,

en andspænis honum þann 21. marts. Fyrir Zavi-  
jovu geingur sólin þann 18. sept., andspænis henni  
þann 15. marts. Þó geingur sólin fyrir sunnan  
hana, eins og á breiddinni má sjá. Austur hjá  
Eta geingur sólin þann 25. sept., andspænis þann  
22. marts. Þeta við sólu þann 9. okt. móti henni  
þann 6. apr. Meyar-arid geingur austur fyrir sólu  
þann 15. okt. (geingur sólin þar fyrir ofan stjörnu-  
na), en andspænis sól þann 12. apríl. Stjarnan  
er talsvert fyrir sunnan sól. Lambda Meyar-  
innar stendur í Sporðdrefamerki, þar sem  $4^{\circ} 9'$   
eru af því mælbar, þar er sólin þann 28. okt.,  
og er sólin fyrir sunnan stjörnuuna. Andspænis  
stjörnunni er sólin þann 25. apríl. Metastálamerki  
sólbrautarinnar endar  $4^{\circ} 9'$  fyrir vestan Lambda  
Meyarinnar, eða  $9^{\circ}$  fyrir austan Arid. Það er á-  
líka langur vegur fyrir austan Arid sent helmingur  
bilsins milli Arins og Eta Meyarinnar. Þennan  
reit, hvar Metastálamerkið endar, má og finna með  
því að mæla út með auganu eins langt bil vestur  
frá Lambda, sem bilid er milli Klappa og Lambda.  
Í þessum sama reiti byrjar Sporðdrefamerki sól-  
brautarinnar; þar er sólin þann 24. októberis, en  
andspænis honum þann 21. apríl.

## 7. Metastálirnar.

Mennt halda að Metastálirnar hafi átt að  
merkja jöfnub dags og natúr. Í fyrri daga var í  
stjörnumyndu bréfunum og á himinmyndahnottnu-  
um málabor Mochns, er skal hafa fundið upp að

vega á metastálum. Þegar Blástjarnan er rúmlega í suburhollu austri, Sjostirnid að eins ófomid í norður, þá er hérumbil í súdri stjarna annarar stærðar eða þriðju, er heitir Alpha Metastálanna; er það sú stærsta á súdri Skálinni. Hún er og kölluð Ríffa hin súdri. Þá er nálægt vesturhollu súdri hátt á lopti raubleita stóra stjarnan Arcturus í Nautamanni. Skammt austur og uppundan í Ríffu súdri er önnur stjarna eins stór, eða annarar eða þriðju stærðar, er heitir Beta, hvor eð er stærst á nýrdri Skálinni, og geingur hún hérum 26' mínútum á eptir Ríffu súdri. Kallast svo Beta með lífum hætti Ríffa nýrdri. Þessi Ríffa nýrdri gjörir ásamt Arcturus og Meyar-arinu nærri jafnhlida þríhyrning. Er Arcturus nærri suburútsúdri mjög hátt, þegar nýrdri Ríffa er í súdri, og Meyar-arid rúmlega í suburútsúdri lágt á lopti. Skammt austur og niðurundan báðum þessum Ríffum eða Alpha og Beta, eru aðrar tvær stjörnur, sín undan hverri, nokkud minni enn hinar, þær eru þriðju stærðar og heita Zóta og Gamma. Þær fjórar stjörnur Alpha, Beta, Zóta og Gamma mynda nokkurnvegin ferhyrning, er Zóta sú vestari nedri, og Gamma hin austari efri. Hinar aðrar stjörnur í Metastálunum eru minni, og sýnist ekki verðt að telja þær. Hinna tölbu stjarna vorfúnts — og miðbaugsfjarðir eru sem í þessu tobluforni greinir, reiknadar við aldarbyrjun.



	Dorknútss- fjard.			Midbaugsf.		
Ríffa syðri . . .	14	stund	40'	3,3	— 15° 12'	+15,3
Jóta . . . . .	15	—	1	3,3	— 19 1	+14,1
Ríffa nýðri . .	15	—	6	3,2	— 8 38	+13,8
Gamma . . . . .	15	—	24	3,3	— 14 7	+12,6

Af midbaugsfjardunum má hér sjá að Gamma geingur nærri eins hátt sem Ríffa syðri. Raunar eru tvær stjornur í Skálamerki er heita Gamma, er sú önnur Gamma nærri niður við sjóndælsbarhring lítid austur einn Alpha, og er af sunnum eignuð Sporddrefamerki. Þessi er áður getid hér í Meyarmerkinu að sólbrautin gangi nærri Ríffa hinna syðri. Sú stjarna hefur 0° 23' norðlæga breidd, er því sólbrautin lítid eitt uedat einn stjarnan. Leingd þessarar stjornu er 7 s. 12° 18', þar er sólin þann 31. okt. en andspænis þann 3. maí. Frá syðri Ríffu geingur sólbrautin ein nú til landsýndræ, eða með öðrum orðum: hún laffar eptir því sem austur eptir dregur og geingur uedan til við stjornu annarar stærðar á höfði Sporddrefans, er heitir Acrab eða Beta Sporddrefans. Við þessa stjornu endar sólbrautariunar Sporddrefamerki, þó Þýræimariunar Sporddrefamerki nærfelt þyrji þar. Um þessa stjornu verður hér uokfud meira talad, þar sem lýst verður Sporddrefamerki.

## 8. Sporddrefinn.

Þennan Sporddrefa fendi Diana til að drepa með epturbíti veidimanninu Orion, þegar hann ætl-

adi sér að eyðileggja öll villudýr jarðarinnar. Til launa fyrir verkid setti hún Sporddrekann milli stjarnanna. Um þær sömu myndir sem Norðurkórónan geingur úr háfudri, ellegar Gímsteinninn í henni, (sjá Lv. 1. d. bls. 46) sem er, þegar stjörnutíminn er 15 eða 16 stundir; þá er í fudri stjarnan Acrab, sem nýlega var nefnd í niðurlaginu um Meta-skálamerki. Hún er álíka stór sem Ríffurnar, eða nýrdri Meta-skál. Acrab er því stjarna annarar stærðar og tvíftjarna. Þá er Sjöstirnir nærri í norðri og Blástjarnan í austurhornu landsfudri, Castor og Pollux í út-norðri, Raupamannastjarnan í vesturhornu norðri. Dragi maður línu í gegnum nýrdri Róffu (Beta í Meta-skálinu) og í gegnum Acrab (Beta Sporddrekans), og haldi þeirri stefnu austur og niður, nær helming vegar við bilid milli þessara stjarna, eða álíka langt frá Acrab, sem Gamma í Skálamerki er langt frá Beta í Skálamerki, þá kemur að stórrí randleitrí stjörnu fyrstu stærðar, er heitir Antares, Alpha Sporddrekans, eða Sporddrekans hjarta. Hún er svo nedarlega, að hún sést ekki frá Íslandi nema frá fudurströnd þess, hvar fjallalaust er; þar er hún í háfudri rétt við fjóndæildarhring. Þessa stjörnu, Antares, má finna með því að taka beina stefnu í gegnum Blástjörnunna og Alpha í Herkúlesi (Mas Algethi), og halda henni áfram langt til fudurs. Einnur stendur Antares á fudurhorni þess þríhyrnings, hvors' austurhorn er Blástjarnan nærfelt í landsfudri, og hvors vesturhorn er Arcturus í út-fudri. Milli Antares

og ferhyrningsins í Metastálum standa Beta, Delta og  $\gamma$  Sporddrefans í boga, er sírsla nætti, ef annar sírfilfótur væri settur í Antares. Sú efska Beta er stærst, og er sú áður ungetna Acrab, sem er annarar stærðar. Delta og  $\gamma$  eru þridju stærtar, og standa nærri því hvor umdur undan annari, þó vestar þær nedri tvær. Delta heitir og svo Jelar-  
fran. Þorknúts og midbaugsfjærdir þessara stjarna voru um alda nútíu þessar:

	Þorknúts- fjærd.		Midbaugs- fjærd.	
$\gamma$ . . . . . 3	15 stund. 47'	3,6	— 25° 32'	+ 11,0
Delta Jelar- fran . . . . 3	15 — 49	3,5	— 22    2	+ 10,9
Beta Acrab 2	15 — 54	3,5	— 19   15	+ 10,5
Alpha Anta- res . . . . . 1	16 — 17	3,6	— 26   58	+ 8,7

Leingð stjornunnar Beta eða Acrab er 8 s. 0° 24' og breiddin 1° 4' norðlæg; hún er því uppbyrjun Bogmanns í sólbrantinni, þó hún sé í uppbyrjun Sporddrefans í Dýræriminni. Þar er sólun þann 23. nóv. en í andstefnu þann 22. maí. Frá Acrab lættar sólbrantinn austur eptir einn má, þó ekki öldungis eins mikil sem frá Ríßu syðri til Acrab; en jeg hef áungva hentuga stjörnu í Sporddrefa-  
merki framur til að mída sólbrantina við.

## 9. Bogmaðurinn.

Bogmadurinn er máladur eins og Centaurus, það er mynd, sem framan og ofantil er madur, en aftan og nedantil hestur. Þetta á að þýða reid-

manninn Chiron, er skal hafa fundid upp að ríða. Hann var fósturfaðir Jafons. Stjörnumerki þetta er svo nedarlega í háfudri að ekki sjást frá Íslandi nema stjörnur þær sem á höfðinu eru. Þegar Sirrah eða Alpha í Andrómedu er í austri, Sjostirnid lítid úr landuorðri, Blástjarnan lítid úr fudri og Althair rúmlega í austurhollu fudri, þá er midurvid fjóndeildarhring í fudri þyrping af stjörnum fjórðu stærðar. Sjá madur og þekki stjörnuflökk herra á lopti þar uppundan, sem innibindur í sér stjörnurnar Lambda í Antínús, i, k og l. Sobjektivsskjaldar (Ev. 1 p. bls. 59—60), þá getur sjá flokkur verið manni til leiðbeiningar til að finna höfud Bogmannsins þar rétt midurundan. Stjörnur þær fjórðu stærðar á höfði Bogmannsins, heita Xi, Omikron og Pi austureptir að telja; standa Xi og Pi álíka hátt báðar, en Omikron lítid nedar. Vestar og nedar í sömu þyrpingunni standa tvær stjörnur saman, fimmtu stærðar, er hæglega geta sýnst ein stjarna; verður þá þyrpingin nokkurnvegin tignumynduð. Vestur undan þyrpingunni, á miðjum vegi til stjörnuunar No í Nádurvalda (Ev. 1 p. bls. 55) stendur stjarna 4du stærðar er heitir My Bogmannsins, og er ofantil á boga hennar. Hún er í háfudri þegar höfundid á Rógnsrannum er geingid úr háfudri (Ev. 1 p. bls. 61). Ríðurundan My Bogmannsins er sólbrantinn uppá sitt lægsta, er þar uppþyrjan Steingeitarmerkis sólbrantariunnar, og vetrarsólstöðupunkturinn, þar sem sólin er þann 21. decembris, en andspæn-

is heim reit þann 22 júní. Ur þesön fer sólbrantín að hækka austureptir og geingur í gegnum Bogmanninn nedantil við ádurumgetna stjörnuþyrpingu á höfði hans. Þessi hækfun sólbrautarinnar austur eptir, er í fyrstu mjög litil, svo varla sést annað enn einsög bogi hennar liggi flatur allt til þyrpingarinnar á höfði Bogmanns. En úr því fer hún að hækka meira, og er þessi hækfun sólbrautarbogens orsökinn til þess að sólargángurinn fer nú að hækka. Því eptir hækfun og læffun sólbrantarinnar, hækkar og læffar sólargángurinn.

## 10. Steingeitin.

Hjá Griffjum var þetta merki geitin Amalthea, á hvórrar mjólk Júpíter var alinn í æfni sinni. Sé dreginn lína í gegnum Blástjörmina og Althair í Drinní, og henni áfram haldið til súdurs, þá kemur lofsins að tveimur stjörnum þriðju stærðar, er standa nærri hvor upp undan annari, heitir sú efri Alpha eða Giedi, og hún nedri Beta Steingeitar eða Dabih. Þessar eru á Steingeitar horninn hægri, en Steingeitin horfir til vesturs móti Bogmanni, er lífa horfir til vesturs. Þegar Steingeitarhornið er í súdri, þá er Sjóstirnidið nær í austurlandnordri, Blástjarnan vart í útsúdri, Mirach eða Beta Andrómedu í austri, og vinstri Grútshornið þar nærri niðurnundan. Þá geingur Urans angað, Aldebaran, upp í austurhelli landnordri. Þá geingur og Denebola undir, vart komin í útneður, hvar fjallalanst er. Frá Íslandi má sjá alla Stein-

geitina nema framfætur hennar. Efri stjarnan á Steingeitarhorninu er rannar tvær stjörnur. Nær hálfa öðru stundarbili anstar ein Steingeitarhornid, eru tvær stjörnur fjórðu stærðar, þó nokkud neðar, heitir sú vestari Gamma, og sú austari Delta Steingeitar; annars heita þær Nashira fremri og aptari. Fyrir neðan þá vestari eða Gamma, er Epsilon, stjarna fjórðu stærðar. Þessar þrjár stjörnur Gamma, Delta og Epsilon eru í súðri nær því undireins og Enif, eða Epsilon í Pegasus. Þorknúts og midbaugsfjærdir þessara stjarna árið 1800 voru þessar:

		Þorknúts- fjærd.			Midbaugs- fjærd		
2 Alpha Steing.	3	20	stund 7'	3,3	— 13° 9'	— 10,5	"
Beta . . . . .	3	20	— 10	3,4	— 15 24	— 10,7	
Gamma . . . . .	4	21	— 29	3,3	— 17 33	— 15,8	
Epsilon . . . . .	5	21	— 26	3,3	— 20 21	— 15,7	
Delta . . . . .	3	21	— 36	3,3	— 17 2	— 16,2	

Í gegnum Steingeitina liggur sólbrautin þannig, að hún liggur yfir um snoppuna á henni, tvöfalt svo langt fyrir neðan Beta, sem Beta er fyrir neðan Alpha, og byrjar á því svæði Vatnsberamerki sólbrautarinnar, þó þar byrji nærfelt stjörnumerkið Steingeitin. Þar er sólin þann 20. jan., ellegar 21ta eptir því hvornin á stendur hlaupárum og öldum. Í andstöðupunkti er sólin þann 23. júlí, hvar Ejónid byrjar í sólbrantinni; og er um þetta getið hér að framan í Krabbamerki. Frá Steingeitarfnoppunni heldur nú sólbrautin áfram til austurs eða landnordurs, því nú hækkar hún

til austurs, en lættar til vesturs, eða réttara sagt, einnög maður horfir eptir heimi austur eptir eða vestur eptir. Fyrir ofan Gamma og Delta liggur sólbrantarboginn nærri eins langt eins og Epsilon er langt fyrir undan Gamma; er þar 20ta gráða Vatnsberamerkis, þvar sólir er þann 11 martii, en í andstöðupúnkti 20tu gráðu Vjóns þann 13. aug. Þessa andstöðupúnkta í merkjumum geta menn fundið með því annaðhvort að telja 6 merki áfram eða til baka; t. a. m. Vatnsberamerki er í leingdarreikningi kallað 10 s. (þó það sé raunar 11ta merki). Dragi jeg 6 frá 10 kemur 4 s. sem er Vjónid. Leggi jeg 6 við 10 kemur 16 s.; en þar merkin eru ekki fleiri en 12 í hringnum, þá er hér byrjun nýrrar umferð á sama hringi; kastar maður þá í burtu 12, verður þá eptir 4 s., sem er Vjónsmerkið, eins og áður. Með sama hætti má finna þverslefnureitina (Quadraturas) með því að leggja 3 merki, ( $\frac{1}{4}^2$ ) við, eða taka frá. Allt eins Sertungareitina báða, með því að leggja 2 merki ( $=\frac{1}{6}^2$ ) við, eða taka frá; og lofsins Þridjungsreitina (Trigonos) með því að leggja við Þridjungs hringi ( $=\frac{1}{3}^2$ ) eða 4 merki, ellegar taka frá. Allsaman þetta var í miklu álitu í fyrri daga, meðan stjornuspádóms trúin var við líði, en er nú í langtum minna gylði. Þó er það ekki orðið ónýtt að finna þessar deilingar sólbrantarinnar, því af þeim má vita afstöður tungs og sólar innbyrdis, líka jarðstjarnanna og sólstjarnanna, og stundamun gangu þeirra innbyrdis, því

hvert merki gyldir við tvær stundir, þar allur hringurinn eða 12 merkin gylða í daggaungunni við 24 stundir. Hér af flýtur, að hver sú stjarna sem er í þverstefnu við sólina (Qvadratura) stendur þrjú merki langt frá sólinni, og er þess vegna 6 stundum á undan eða eftir sólinni, líft og túnglíd í kvartilaskiptum þess. Samt er í uákvæmum reifungum réttara að telja stundirnir á midbaugi heldur enn sólbrantinni, vegna þess að sólbrautin hallast við midbaugi eins og áður er sagt; hvar af þá flýtur, að sólbrantarbogiinn ris sumstadar og fellur annarstadar, eins og hér er umtalad í hverju merki, og af hverju aptur flýtur það, að sólar-gangurinn hækkar og lækkar eftir árstíðunum. Þar var víðad frá áðan, er sólbrautin lægi fyrir ofan Gamma og Delta Steingeitar. Þar geingur sólbrautin yfirum mjöddina framan spordinn á Steingeitinni, er beigir sig þar í hring, og setur í hringnum spordinn rétt upp. En það má lesaranum þýkja undarlegt að hér er talad um spord á Steingeitinni eins og hún væri fístur. En þetta kemur þannig til: að stjörnumerkin, eða réttara sagt þeirra heiti, eru komin frá Egiptum áður enn þau komu til Gríffja. Hjá Egiptum voru merki þessi teifu árstíðanna, og nokkurskonar astrónómískir Hieroglyphar eða myndaskriftir, er þýða skyldu einhvern sannleika. Þannig á Steingeitin að þýða þann sannleika, að sólin fari eftir vetrarsólstöðurnar að hækka gaungu sína frá hinni lægstu þvol sinni; því Steingeitin snýr sér ætíð upp í móti, þegar hún bitur gras, af því



hún hefur framfæturnar stuttar, og stigur þessvegna og flíðar upp á við frá fiskinum sem býr í vatninu dýpt í dalnum, þessvegna er Steingeitin málund aptan til eins og fiskur með spórdi, hvaðan hinn fremri hluti búksins þá flíðar.

## II. Vatnsberinn.

Eftir frásögu Grótkja á Vatnsberinu að bera Deucalion Prometheusarson, sem í því thessalíska vatnsflóði komst af einfamall, ásamt með fönn sinni Þyrrihu. Þegar Blástjarnan er í vesturáttfudri, Sjostirnir nálægt suðurhollu austri, Mirraf eða Alpha Persensar í austurlandsfudri, Sirrah, eða Alpha Andromedu í landsfudri, Algenib eða Gamma í Pegasus lífa í landsfudri, Alamaf eða Gamma Andromedu í austri, Benetnasch eða Eta Stóra-Bjarnarins í útunordri, þá er vestari orl Vatnsberans í fudri, er þar stjarna þriðju stærðar, er heitir Beta Vatnsberans, á arabísku Sadalsund. Hinn er litid vestar enn rétt upp undan Epsilon Steingeitar. Uppýfir Beta Vatnsberans, þó litid vestar, er Follinn, og enn nú vestar og ofar Hofríngurinn. Beta Vatnsberans er hérnum  $1\frac{1}{2}$  stundar bil austar og ofar enn Steingeitarhornid, og á þeirri stefnu midri, sem er á milli Alpha Steingeitar og Beta Vatnsbera, eru tvær stjornur saman, fjórðu stærðar, sú vestari Epsilon, hin austari My Vatnsberans. Fyrir austan og ofan Beta Vatnsberans er Alpha Vatnsberans, stjarna þriðju stærðar, á arabísku Sadalmelik, og er það hægri eða austari orl Vatnsber-

ans. Þetta er allt í sömu stefnunni frá Alpha Steingeitar. Skipti maður þessum beina vegi í þrjá jafna parta, þá nær fyrsti þridjungurinn frá Alpha Steingeitar til Epsilon og My Batnsbera, annar til Beta, og þridji til Alpha Batnsberans. Þessi Alpha Batnsberans eða Sadalmelik finnst líka með því móti, að dregin sé lína í gegnum tígul Hofrúngsins og í gegnum Gamma og Delta Tolans. Þess Alpha, anstari oxlin, er líka þekktanleg af því að hún er hin vestasta af fjórum stjörnum námm, er mynda dælitinn kráfastig, er vegna þéttleika síns aðgreinir sig frá öllum öðrum stjörnum þar í nánd. Þær þrjár anstari stjörnurnar í þessum kráfastig heita í red anstureptir frá Alpha að telja: Gamma, Zeta og Eta Batnsberans. Gamma (3) gjörir í kráfstignum horn niðrúvíð, Zeta (4) horn uppávíð og Eta (4) endar kráfstiginn austantil. Gamma heitir líka Sadachbia, og er á framhandleggi Batnsberans hægra, Zeta á höndinni og Eta á stjólunni. Öfantil við Zeta er lítil stjarna Pi (5), og fyrir neðan þær þrjár stjörnur, Gamma, Zeta og Eta, er önnur stjarna finntu stærðar, í beinni stefnu við Pi og Zeta, er heitir Rappa Batnsberans, einnig kallað Batnsberans Ansa, situla. Hún er álíka langt frá Gamma, sem Gamma er frá Pi. Sé nú stefnunni gegnum Pi, Zeta og Musna langt dregin niðrúvíð, kemur lofsins á hægra fæti Batnsberans stjarna þridju stærðar, er heitir Delta Batnsberans eða Scheat. Hún er álíka sunnarlega sem Delta Steingeitariinnar, eða geingur eins lágt sem hún, þeg-

ar í súdri er. A stefnuinni frá Musunni til Delta og Gamma Steingeitarinnar er á þriðjungi vegar Þeta fjórðu stærðar stjarna, er og heitir Ancha, á hægrimjodm Vatnsberans. Stefnan í gegnum Zeta og Þeta lendir á Jota (4) sem er vinstri mjöðmin. A vatnsflóðinu sem hellist úr skjólunni, er beygist eins og krókur á vatnsfalli, stendur skamt austur og niður undan Musunni, Lambda (4); hún er nærri í beinni stefnu við Gamma og Musna, og álíka langt frá Musunni, sem Musan er frá Gamma. Hinar adrar stjörnur á flóðinu eru smáar, hvor af þær stærstu, sem eru 5tu stærðar, mynda fjóra adgreinda smáhöpa, er radast í bugðu austur og niður frá Lambda. Þorfnúts og miðbaugsfjarðirnar merkilegustu stjarnanna í Vatnsberamerki voru um aldamótin þessar:

	Þorfnúts- fjærb		Midbf.	
Epsilon . . . . .	20 stund 37'	3,2	— 14° 13.	— 12,7 <sup>"</sup>
Upsilon . . . . .	20 — 42	3,2	— 9 43	— 13,0
Beta . . . . .	21 — 21	3,1	— 6 26	— 15,4
Jota . . . . .	21 — 56	3,2	— 14 50	— 17,1
Alpha . . . . .	21 — 55	3,0	— 1 17	— 17,7
Þeta . . . . .	22 — 6	3,2	— 8 46	— 17,6
Gamma . . . . .	22 — 11	3,1	— 2 23	— 17,8
Pi . . . . .	22 — 15	3,1	+ 0 22	+ 18,0
Zeta . . . . .	22 — 19	3,1	— 1 2	— 18,1
Eta . . . . .	22 — 25	3,1	— 1 9	— 18,3
Rappa . . . . .	22 — 27	3,1	— 5 15	— 18,4
Lambda . . . . .	22 — 42	3,1	— 8 38	— 18,9
Delta . . . . .	22 — 44	3,2	— 16 53	— 18,9

Af þeim hér töldu stjörnum er einungis Pi norðantil við miðbaug, en hún fjarlægist hann alltaf, þar hún gengur norðureptir, eins og sjá má af risi

sólbrautarinnar um það svæði. Frá Steingcítar-  
spordi geingur sólin yfirum kvíð Vatnsberans mitt  
á milli Múcha og Jóta; og þegar hún geingur aust-  
ur hjá Múcha, er hún (sólin)  $2^{\circ} 45'$  fyrir summan  
hana, því breidd þeirrar stjörnu er norðlæg  $2^{\circ} 45'$ .  
Leingd hennar er 11 s.  $0^{\circ} 28'$ , og má þar af sjá  
að þar byrjar Fiskamerki sólbrautarinnar, og er  
sólin þar þann 19. febr. en í andstöðu þann 23.  
aug. Þar fyrir austan geingur sólbrautin ofantil  
við Lambda Vatnsberans; er þeirrar stjörnu leingd  
11 s.  $8^{\circ} 47'$  og breidd  $0^{\circ} 22'$  suðlæg; geingur  
því sólin austurhjá þeirri stjörnu þann 27. febr.  
en andspænis þann 1. sept.

## 12. S i f t a r n i r.

Eftir skáldasögnum breytti Venus sér og Cu-  
pido í fiskalífi, og steypti sér í Cyphratesfljótið vegna  
ótta við risan Typhon. Í minningu þessa til-  
burðar settu menn tvo fiska meðal stjarnaanna. Fiska-  
merkið hefur að mestu mjög ómerkilegar stjörnur;  
þó er þar ein stjarna þriðju stærðar, er kallast  
Fiskahnútur, því hann er á bandi því er spyrðir  
Fiskana saman, þó langt sé á milli Fiskanna sjálf-  
ra, og bandið þess vegna mjög langt. Sá myndri  
Fiskurinn liggur upp undir vinstri handrika And-  
rómedu, er hann þar með opnum munni, eins og  
hann ætli að bíta hana, eins og hann skyldi vera  
skrimslid, er ungetur Ev. 1 d. blf. 32. Þinn Fisk-  
urinn horfir til vesturs, og er austan til við stjölun  
Vatnsberans. Fiskahnúturinn, Alpha Fiskanna, verð-

ur fundinum með því að taka stefnu frá Gamma Andrómedu (Mamak) til Alpha Brútsins (Hamal), og halda henni áftam til sudurs vel eins lángan veg, og er þá á því svæði er þá kemur, eingin önnur stjarna eins stór, til villu. Þegar Fiskahnútturinn er í sudri, þá er Sjóstirnib rúnilega í sudurhøllu landsudri, Blástjarnan í vesturhøllu, úturdri, og Kaupamannastjarnan í austurlandsudri. Milli Fiskahnútsins og Algenib í Pegasus eru þrjár stjornur fjórðu stærðar, Delta, Epsilon og Zeta, þá austureptir er talib. Það má og falla, að þær séu á stefnunni milli Fiskahnútsins og Markab í Pegasus. Delta, Epsilon og Zeta Fiskanna eru á þeim parti Fiskabandsins, er liggur milli Fiskahnútsins og sydra Fisksins. Þær eru að mestuleiti í rób, en mynda þó dálitnu boga eða bugðu, og suyr í-hyolfan niður. Zeta Fiskanna er í sjónpipnum tvöföld, svo að sú vestari er sjöttu, en sú austari sjöundu stærðar. Delta er á þeirri stefnu við Scheat og Algenib í Pegasus. Vorknúts og midbaugsfjærdir þessara stjarna í Fiskamerki voru um aldamótin þessar:

	Vorknúts- fjærð.	"	Midbaugesf.	"
Delta . . . . .	0 stund 38'	3,1	+ 6° 30'	+19,7
Epsilon . . . . .	0 — 35	3,1	+ 6 49	+19,5
Zeta . . . . .	1 — 3	3,1	+ 6 31	+19,3
Alpha . . . . .	1 — 52	3,1	+ 1 48	+17,7

Frá Lambda í Vatnsberamerki geingur sólbrautin til Zeta Fiskanna, hvórrar leiugð er 0 s. 17° 5' og breidd 0° 13' suðlæg, þar er sólin þann 8. apríl.

og í andstöðu þann 11. októb. Á beinni stefnu milli Lambda Vatnsberans til Zeta Fiskanna geingsólbrautin í gegnum vorfnútiun; er hann þar, eins og sjá má af leingdum þeirra stjarna,  $21^{\circ}$  austur frá Lambda Vatnsberans, en  $17^{\circ}$  vestur frá Zeta Fiskanna. Hann er því að eins  $2^{\circ}$  anstar enn á midju bili milli þeirra stjarna. Í vorfnútnum er sólin þann 21. mars, en í andstöðu þann 23. sept. venjulegaft. Í Lv. 1. d. blf. 65 er vísað til vorfnúts nidurnndan Sirra og Algenib, eða þó  $\frac{5}{8}$  bilsins milli Algenib og Markab, vestur frá Algenib, mælt frá þeim punkti sem er eins langt fyrir neðan Algenib, sem Algenib er fyrir neðan Sirrah.

## S j ó r d a g r e i n

um

### S u d u r m e r k i n.

#### 1. S v a l u r i n n.

Þessi Hvalur á að vera skrímsli það, er Neptunus sendi á land til að gjöra tjón og svelgja Andromedu, sjá Lv 1. d. blf. 32. Þetta stjörnu-merki yfirgripur stórt svæði fyrir sunnan Fiskana og Grútinn. Á efra skolti Hvalsins er stjarna annarar stærðar, heitir Alpha Hvalsfiskjarins eða á arabísku Menkar. Hún er á sudurodda þess jafuarmada þríhyrnings, er maður ímyndar sér að nemdi með norður hornum sínum við Sjóstirnid og Grúthornin. Einnir er hún í beinni stefnu við Mondul-

stjornuna og Algol. Hún hágeingur nær 1 stundu síðar enn Hamal, en nær  $\frac{3}{4}$  stundar á undan Sjöstirniinn. Höfundid á Hvalnum er midurnandan Flugunni, og er að útliti líft hofdinn á Hrútnum, nema hvað stjornurnar standa gisnara á Hvalsstofdinu en á Hrútsstofdinu, og stjornurnar á Hvalsstofdinu standa ekki eins hallt sem á Hrútsstofdinn. Það eru stjornurnar Alpha, Gamma og Delta í Hvalnum, er standa líft af sér sem Alpha, Beta og Gamma í Hrútnum.

Stjornurnar Alpha og Gamma Hvalsins eru rétt austurundan Fiskahnútnum; svo að í röð standa þá vestureptir er talid, alls fjórar stjornur: Skappa (4), Alpha (2), Gamma Hvalsins (3) og Alpha Fiskanna (3); er svo á lífa langt frá Skappa til Alpha, sem frá Alpha til Gamma, og svo þaðan aftur tvöfalt svo langt frá Gamma Hvalsins til Alpha Fiskanna, verður svo eins langt á milli Skappa og Gamma sem á milli Gamma og Alpha Fiskanna. Vestan og undan til við Gamma er Delta Hvalsins á nedra skolti hans; er sú stjarna þriðju stærðar, og er stærra milli hennar og Gamma, enn á milli Gamma og Alpha. Dragl mennu línu frá Menkar til Delta, og haldi henni áfram vestur og niður, þá kemur Furdustjarnan (Mira); samanber Stjornufræðina bls. 144; hún heitir Omikron Hvalsins, og stendur á hálsi hans, og er ein af breytilegu stjornunum. Árið 1596 þann 13. aug. tók Fabricius fyrstur eptir því, að stjarna þessi breytir útliti sínu, svo hún er stundum eins og stjarna

annarar stærðar, og heldur því fíni hálfan mánuð; því næst minnar hún í 3 mánuði, uns hún hverfur með öllu, og sést ekki aptur, fyrir enn eptir 5 mánuði lidna; svo fer að grilla til hennar aptur, og hún smáskirist, þágangad til hún er aptur orðin sem björtust að libnum 332 dögum. Annars er það nokkud ójafnt hvað leingi hún sést og ekki sést. Hún er álíka langt frá Delta sem Delta er frá Alpha. Í þessari sömu stefnu vestur og niður, kemur á búi Hvalsins stjarna þriðju stærðar, er heitir Zeta Hvalsins, líka Baten Raitos, álíka langt frá Mira, sem Mira er frá Gamma. Vestur og niðurnundan Zeta er Beta Hvalsins, stjarna þriðju stærðar, kallad líka Diphda eða Deneb Raitos. Hún er rúmlega svo langt frá Baten Raitos, sem Baten Raitos frá Mira, en er dálitill ófar enn á beinni stefnu. Á búi Hvalsins er skakkerhyrningur, í hvors eina horni, hinu austasta, er Zeta, á neðsta Tau (3), á efsta Peta (3), á vestasta Eta (3). Ferhyrningshlidin, Tau Zeta, horfir á Fiskahúti, Tau Eta á vorfúti, Eta Peta á Menkar. Á brjósti Hvalsins er annar ferhyrningur minni, ekki eins hornstakfur sem hinu. Hann er á stefnu undan Gamma og Delta. Þar austari tvær eru: Epsilon (3) og Pi (3), þar vestari tvær Rho (4) og Sigma (4). Hlidin, Pi Epsilon, horfir á Mira, og hinar vestari báðar eru þeim samföda. Á stefnunni frá Epsilon og Pi niðurá við eru nokkar stjörnur niður við sjóndeildarhringinn, er eiga heima í Eridanusfljóti. Hvalurinn snýr á sig lyffju í fringum Deneb Rai-



tos, en fyrir vestan og ofan Deneb Kaitos, álíka hátt sem Peta er á sporði Hvalsins, hvörn hann réttir þar upp, stendur stjarna þriðju stærðar, er heitir Zóta. Hún er nærri suður undan vorfnútnum. Vorfnúts og midbaugeskjærdir í Hvalnum voru þessir nu aldamótin.

Zota . . . . .	4	0	stund	9'	3'0	—	0°	56'	—	20
Beta . . . . .	3	0	—	34	3,0	—	19	5	—	19,8
Eta. . . . .	3	0	—	59	3,0	—	11	16	—	19,4
Peta . . . . .	3	1	—	14	3,0	—	19	13	—	19,0
Tau . . . . .	3	1	—	35	2,9	—	17	0	—	18,3
Zeta. . . . .	3	1	—	42	2,9	—	11	20	—	18,1
Omikron Mira	3	2	—	9	3,0	—	3	53	—	16,9
Ko . . . . .	4	2	—	16	2,9	—	13	12	—	16,6
Sigma. . . . .	4	2	—	23	2,8	—	16	8	—	16,3
Delta . . . . .	3	2	—	29	3,0	—	0	32	—	15,9
Epsilon . . . . .	3	2	—	30	2,9	—	12	44	—	15,9
Gamma . . . . .	3	2	—	33	3,1	+	2	23	+	15,7
Pi . . . . .	3	2	—	35	2,8	—	14	43	—	15,6
Alpha Menkar	2	2	—	52	3,1	+	3	18	+	14,6
Kappa . . . . .	4	3	—	9	3,1	+	2	38	+	13,6

Hér fyrir utan eru á höfði Hvalsins 4 stjornur fyrir ofan Menkar og Gamma nærfelt í ferhyrningi eða kráfastig vestanfrá að telja: Xi, Ny, My og Lambda, allar fjórðu stærðar.

## 2. E r i d a n n s.

Þetta fljót, Eridannus, er það, er sfruggur Súppiters ráfu-Phaeton í, þá hann styrði sólarvagninum. Sumir halda það sé Þó á Vallandi, aðrir Níl á Egíptalandi. Þetta stjörnumerki dreifist um stórt svæði milli Orions, Hérans, Dúfunnar, og Hvalsins. Það liggur í krókum ansturfrá ferhyrningnum

á brjósti Hvalsins. Þessar eru andfennilegastar stjornur austur og uppfrá Epsilon Hvalsins, á bug uppávið: Eta (3), Iota (4) efst niðurnundan Menfar; síðan beigist niðrávið, og kemur Zeta (3), Epsilon (3), Delta (3), Pi (4), Gamma (2) stærst, og lægst á bug niðrávið; beigist svo uppávið, kemur þá Omicron (3), Xi (4), svo efst tvær stjornur saman, hvor upp undan annari, báðar (4); þá beigist niðrá, og kemur My (4), og lofsins Beta (3), skamt vestur og upp undan Rigel (i Orioni). Eta i Eridannus heitir Azha, Zeta heitir Zibal, Delta heitir Rana secunda, Gamma heitir Zaurak, Omicron heitir Beta Urša. A syðra armi eða bug Eridannusfljótsins, er liggur til suðausturs frá ferhyrningi Hvalsins, eru 1 Tau (4), 2 Tau (4), E (3), sem er nedst á bug, hækkar svo nokkud, og kemur s (4), t (4), m (4), l (4), og er þá komið niðurnundan Zaurak. Þessi suðausturarmur fljótsins liggur austur til Grafalsins og Dúfsumar, þar beigist fljótið niðrávið og hverfur ofið Jösendingum undir sjöndeilbarhringinn. Þessar voru vorknútsfjærdir og miðbagnsfjærdir stærstu stjarnanna um aldamótin.

Eta . . . . .	3	2	stund 47'	2 9	—	9° 42'	— 15 0'
Zeta . . . . .	4	3	— 6	2 9	—	9 34	— 13,8
Epsilon . . . . .	4	3	— 23	2,9	—	10 9	— 12,6
Delta . . . . .	3	3	— 34	2,9	—	10 27	— 11,9
Gamma . . . . .	2	3	— 49	2,8	—	14 5	— 10,9
Omicron . . . . .	4	4	— 2	2,9	—	7 22	— 9,8
Beta . . . . .	3	4	— 58	2,9	—	5 21	— 5,3

Af þessari teblu má sjá að Eridannusfljótið er samferða Uramerki í miðbagnhringinn.

### 3. Veldisprotinn.

Þetta er sú þrífæsti veldisproti er myndadur var á þínni ár 1688 af þáveranda stjörnspekingi Kirch. Þetta litla stjörnumerki liggur milli nyrðra og syðra arms á Eridanfsjóti, skamt fyrir vëstan Þéramm og Nígel í Dríoni. Það er þekktanlegt af þremur stjörnum fjórðu stærðar, er standa þar hvor nídurnundan annari í röð, og er nærri jafnlángt milli þeirra. Það er í hásubri rétt nídurnundan Aldebaran í Uraunni, og er efska stóra stjarnan rétt vesturundan Nígel í Dríoni.

### 4. O r í o n.

Dríon var mikill veidimadur og hetja í fornöld, og fylgdi á eyunni Krít Díonu og Latónn á býraveidum. Þetta stjörnumerki innibíndur í sér bæði Fjósakonnurnar, Fjósakallana, er vér Jólendíngar svo kóllum, og meira til, bæði ofan þetta og neðan, Fjósakonur vorar eru Dríonsbelti, heitir sú vestasta Delta eða Míntaka, (2); sú í mídib Epsílon eða Alnílám (2) og sú anstasta Zeta eða Alnítak (2). Delta er að mestu í mídþaugi. Fyrir neðan Fjósakonnurnar eða Dríonsbeltib, er Dríonsfverð, er vér nefnum Fjósakalla, er það röð, sem stendur nærri nyp og ofau og sýníst að mestu samanhángandi, vegna þess þar er stjörnuþoka í milli. Efst í Fjósakóllumum er 1 c og 2 c, stjörnur sjöttu stærðar. Þar fyrir neðan er tvístjarna eða margstjarna serföld; er þar í fríng greínótt stjörnuþoka, sem málub er í Stjörnufræðinni Fig. 27. Tab. 1V.

en útskýrd bls: 155. Þessi Serstjarna er kallud Þeta í Drioni, Fyrir nedan Margstjörnuna og stjörnuþokuna Þeta, er stjarna þriðju stærðar er heitir Zeta Drions, og fyrir nedan Zeta er Þpsi-lon, stjarna fjórðu stærðar, og endar hér sú röð, er vér kllum Fjósakallana. Fyrir ofan Fjósakomurnar eru tvær stórar stjornur, sem eru Drions-Arlir. Sú vestari heitir Gamma Drions, stjarna annarar stærðar, heitir líka Bellatrix. Hin austari Alpha Drions eða Beteigenze, er fyrstu stærðar, raubleit stjarna. Fyrir nedan Fjósakalla vestur og niður er stór stjarna, Beta Drions, eða Rigel, stjarna fyrstu stærðar á vestara fæti Drions. Austur og niðrundan Fjósakallunum og austurundan Rigel, er Rappa Drions eða Saiph, stjarna þriðju stærðar, á hægri kné Drions. Undir vestustu Fjósakomunni, þó lítið vestar, er Eta Drions, stjarna þriðju stærðar. Undir austustu Fjósakomunni er Sigma, stjarna fjórðu stærðar. Fyrir ofan arlirnar, á andliti Drions, eru einkum þrjár stjornur í þyrpingu; sú efsta Lambda Drions, er fjórðu stærðar, hinar tvær nedri heita Phi, fimmtu stærðar. Lambda Drions heitir líka Heka. Á ljónshúðinni, sem Drion heldur á, eru vesturundan Beteigenze og Bellatrix, þrjár stjornur hvor niður undan annari: Pi, q og r Drions, allar fjórðu stærðar; q heitir og Tabit. Fyrir ofan þessar þrjár eru og á ljónshúðinni tvær stjornur er báðar heita Omicron, Þórar tvær eru fyrir nedan þær þrjár, heita z og s Drions; eru allar þessar fjórðu stærðar. Þorknúts og miðbaugsstærð-

ir hinna merkilegustu stjarna í Orion um alda-  
mótin voru þessar:

Beta, Rigel . . . 1	5 stund. 5'	2,8	— 8 ° 27'	— 4,8
Gamma, Bella- trix . . . . . 2	5 — 14	3,2	— 6 9'	+ 4,0
Delta, Mintaka 2	5 — 22	3,0	— 0 27	— 3,3
Lambda, Gefa 4	5 — 24	3,3	+ 9 47	+ 3,2
Epsilon, Anilam 2	5 — 26	3,0	— 1 20	— 2,9
Zeta, Anitak . . 2	5 — 31	3,	— 2 4	— 2,6
Alpha Beteige- uze . . . . . 1	5 — 44	3,2	+ 7 21	+ 1,4
Rappa Saiph . .	5 — 38	2,9	— 9 45	— 1,9

## 5. G e o r g s h a r p a n.

Þetta stjörnuerfi hefir stjörnufræðingurinn  
Hess myndad úr nokkrum smáum stjörnum er áður  
toldust með Eridannsljóti. Það er í minningu  
eufsa kóngsins Georgs þridja. Harpa þessi er fyr-  
ir ofan Eridannsljót, milli Epsilon í Eridann og  
Megustjarnanna, nedantil við miðbang.

E Georgshorpu 4 | 3 stund 27' | 3,0 | — 0° 14' | — 12,4  
Þessi stjarna er nær því á beinni stefnu milli Delta  
Hvalsins og Delta Orions, og eru þessar þrjár  
stjornur allar í miðbang að mestu.

## 6. S é r i n n.

Það þýðir að lifindum dýraveidar, er því á  
himninum undir fótum veidimannsins Orions. Sér-  
inn er einfur þekktanlegur af tveimur stjörnum vest-  
ur og niður undan Rappa Orions, og standa þær  
að mestu í beinni línu við hana. Sú efri er Alpha  
(3) á arabísku Arneb; sú nedri Beta (3), Ribal.  
Tvær stjornur austur og niður, nokkud minni, mynda

ferþyrning með hinum fyrri tveimur; þær heita: Delta sú efri (4), Gamma sú nedri (4). Milli Delta Hérans og Klappa Orions eru á miðjum vegi þrjár stjörnur: Zeta, Eta og Peta þá talid er austureptir, þær eru fjórðu stærðar.

## 7. Stóri-Hundurinn.

Sumir halda að hundur þessi sé Anúbis er Egiptar tilbádn. Griftir álitu hann fyrir hund Norðr, þann er fylgdi Orióni. Þetta stjörnumerki er austur og niðurnúðan Þjósakomnum, og er andþekkt af hinni merkilegustu stjörnu fyrstu stærðar, sem af fyrðarstjörnum eða sólstjörnum er hin bjartasta á öllum himnum. Hún hefur hvítblátt skín og heitir Sirius. Dragi maður línu í gegnum allar þrjár Þjósakomurnar og haldi henni áfram til landsnuburs, þá hittir maður nærfelt á Sirius, þó lítið eitt ofar. Hún heitir líka Alpha í Stóra-Hundi. Vesturnúðan Sirius er Beta í Stóra-Hundi, stjarna annarar stærðar; á arabísku heitir hún Mirzam, og er hún á efra framfæti Hundsins, er ris uppá endan, eins og þegar hundum er kennt að sitja. Austan til við Sirius er Góta (4), svo Gamma eða Muliphein nokkud ofar (3) eða (4). Rétt uppundan Góta er My (4). A Hundinum eru fleiri stórar stjörnur, en þær sjást ekki frá Íslandi, nema ef telja skyldi Delta, sem er rétt á tafmorknum. Þorfnúts og miðbangsfjærðirnar um aldamótin vörn þessar:

Beta, Mirzam . . . . .	2	6	stund 14'	2,6	— 17° 42,	+ 1,2
Alpha, Sirius . . . . .	5	6	— 36	2,6	— 16 27	+ 3,2
My . . . . .	1	6	— 47	2,7	— 13 48	+ 4,1
Jota . . . . .	4	6	— 47	2,6	— 16 48	+ 4,1
Gamma, Muphlein . . . . .		6	— 55	2,7	— 15 21	+ 4,7

Eptir þessari töflu og framsókninni á þá Siriusar vorfnútsfjærd ad vera 6 ft. 38' árið 1845, en miðbangsfjærdin — 16° 29, þar Sirius færst sundurá. Hann er því í háfudri þegar Sjostirnid er rétt í vesturhollu útsudri. Þá er og Blástjarnan ad ganga úr réttu nordri. Sá hálfí dagbogi Siriusar er eptir miðbangsfjærdinni 3 ft. 37' á Sundurlandi, þar sem breiddin (stadarinn, en ekki stjörnunar) er 64°, 3 ft. 29' á miðju Íslandi, þar sem breiddin er 65° og 3 ft. 21'. Eptir þessu verður þá:

6 ft. 38'

$\frac{1}{6}$  dagbogi á Sundurl. 3 — 37'

uppfoma Siriusar 3 — 1'

Þad er þegar Sjostirnid er í austurhollu sudri.

Uptur er:

6 ft. 38'

$\frac{1}{2}$  Dagbogi 3 — 37'

niðurganga Siriusar . 10 — 15'

Þad er þegar Sjostirnid er tæplega í vesturútsudri.

## 8. Litli-Gundurinn.

Um Gund þenna hafa stáldin ýmsar meiningar. Sumir eigna hann Dríoni, aðrir Jearns eða (Boo-

tes) Nantamanni. Í Minna-Hundinum er lífa ein stjarna fyrstu stærðar, er heitir Alpha í Minna-Hundinum, og lífa Procyon. Þessi stjarna er beint sudurundan Castor og Pollúr; hún myndar einnig nær jafnblíða þríhyrning með Sírius og Beteigeuze á austari Drionsörsl, þannig að Procyon er á austurhorni. Vestur og upp frá Procyon er Beta Minna-Hunds eða Gomeisa, þriðju stærðar stjarna. Procyon er á læri, en Gomeisa á hálssi Hundsins. Þorfnúts og miðbangsfjærdir um aldamótin vorn:

Beta, Gomeisa.	3	1	stund 16'	3,2	+	8° 40'	— 6,5
Alpha Procyon	1	7	— 29	3,1	+	5 44	— 7,6

### 9. Eínhyrningurinn.

Þetta stjörnumerki hefur stjörnufræðingurinn Hevel myndad af mörgum smáum stjörnum milli Drions og Hydra (Batusnadarins). Eínhyrningurinn er eínfum þekktjaulegur af þremur stjörnum fjórðu stærðar, er standa í röð á höfði hans fyrir austan Beteigenze, álíka langt sem er á milli Drionsarls. Sú nedsta og vestasta er á munni Eínhyrningsins, heitir b, (latínsta). Sú í miðid á augann, heitir s, sú efsta, á eyrunum, heitir h Eínhyrningsins. Eínhyrningurinn nær yfir stórt svæði, frá 6tu stund til 9du eptir eptir stjörnutíðinni.

### 10. Prentsmíðjan.

Þetta merki hefur stjörnumeistarinn Bode upp-fenið með í minningu prentverksins uppáfinningar,



og myndad Prentsmíðjuna úr mörgum smáum stjörnum, er áður voru eignadar skipinu Argo. Einkunn eru þar tvær stjornur fjórðu stærðar, er hér mátti telja. Þær standa austurundan Sírius, þó lítið eitt hærra. Þær standa í beinni línu með Beta og Alpha Stóra-Hundsins, eða með Mirzam og Sírius. Sú vestari heitir A Prentsmíðjunnar, og er á lífa langt austur frá Sírius sem Sírius er langt austur frá Alpha Hérans, eða Arneb. Hin austari stjarnan, B Prentsmíðjunnar, er á lífa langt austur frá A, sem langt er á milli Sírius og Mirzam. Vorknúts- og miðbaugsfjarðir voru um aldamótin þannig:

A Prentsm.	. . . 4	7 stund. 42'	2,8	— 13° 23'	+ 8,7
B Prentsm.	. . . 4	8 — 2	2,8	— 12° 21'	+ 10,2

Prentsmíðjan er í háfudi þegar Mínni-Hundurinn geingur úr háfudri.

## II. Skipid Argó.

Skipid Argó var byggt af Argus eptir skipun Minervu og Neptúns; þar á fór Jason leidangursferðina til Góldis. Mesti hluti þessa merkis kemur aldrei upp fyrir sjóndeildarhring hjá oss Íslendingum. Sá hluti merkisins, sem sjáanlegur er hjá oss, innibindur einungis smáar stjornur, þó eru þar tvær stjornur þriðju stærðar, Xi og Zota, niður við sjóndeildarhringinn í háfudri, þegar Procyon er nýlega geinginn úr fudri. Á arabísku heita þar As-míðiske og Turcis. Vorknúts og miðbaugsfjarðir þeirra um aldamótin voru þessar.

Xi, Asmíðiske . .	7 stund 41'	2,5	— 24° 22'	+ 8,5
Zota, Turcis . .	7 — 59	2,5	— 23 44	+ 9,9

## 12. Vatnshadurinn.

Það merki heitir á látinu Hydra, er feisnar langt, liggur fyrir sunnan Krabba, Ejon og Meyu. Það hefur sama uppruna sem Hrasniinn og Biskarinn, eptir skáldmælunum. Apollo vilbi færa Juppiter fórn; sendi hann þá hrasniinn með bikar til að sækja vatn; en hrasniinum dvaldist, og bar hann það fyrir sig, að ormur eða naddur hefði hindrad sig frá því að ausa vatnid. Þarfyrr setti Apollo bikarinn hjá hrasniinum og skipaði naddum að varna hrasniinum drykkjar. Fyrr sunnan Krabbann, en austan Procyon, er hefub Nadarins með stórum stjörnum fjórðu stærðar: Delta, Eta, Epsilon og Zeta. Austur og niðrundan Nadarhesdinu, en vestur og niðrundan Regulus, er Nadarhjartad, Alpha Nadarins, á arabísku Alphard, stjarna annarar stærðar. Austur og niðrundan Alphard er Lambda Nadarins, rétt suðurundan Regulus. Miðpartur búksins á Naddum geingur ofanfyrr fjórdeildarhring hjá ofi, og lífa er nokkru af honum þannig varid, að stjörnur sem eiga heima á Biskarinum og í Hrasniinum, blandaft við Nadarins stjörnur. Eru svo ekki aðrar merkilegar stjörnur eptir að telja, sem einungis heyra Naddum til, nema Gamma og Pi á hala hans. Gamma er að mestu suðurundan Ari Meyariinnar, litid leingra niður enn Zeta Meyarinnar er fyrr ofan Arid. Gamma Vatnshadarins er stjarna þriðju stærðar. Austurundan Gamma er Pi, þó litid nedar; og sést varla nema frá suður-

strönd Íslands. Sú stjarna er eins langt frá Gamma sem Gamma er frá Mepar-Urinu. Þi er stjarna fjórðu stærðar. Vorknúts og midbaugsfjörðir voru í aldarbyrjun þannig:

Delta . . . . .	8 stund. 27'	3,2	+	6° 24'	-12,0
Eta . . . . .	8 — 33	3,1	+	4 6	-12,4
Epsilon . . . . .	8 — 36	3,2	+	7 9	-12,6
Zeta . . . . .	8 — 45	3,2	+	6 42	-13,2
Alpha Alphard. . . . .	9 — 18	2,9	-	7 48	+15,2
Lambda . . . . .	10 — 1	2,9	-	11 22	+17,4
Gamma . . . . .	13 — 8	3,2	-	22 7	+19,2
Pi . . . . .	13 — 55	3,3	-	25 43	+17,6
Jota . . . . .	9 — 30	3,0	-	0 14	-15,9
Peta . . . . .	9 — 4	3,1	+	3 9	-14,4

Fyrir uedan hofubid beigir Vatnsnaburinn á sig lyffju eða hring; og á lyffjunni er stjarnan Jóta, fjórðu stærðar. Hún er í midbaug, eins og sjá má af midbaugsfjörðinni. A hinnum má finna hana með því að draga línu milli Regulus og Alphard, og mæla með auganu rúman þridjung þeirrar línu upp- eptir frá Alphard til Regulus. Aftur er Peta miðsvegar milli Jóta og Zeta Vatnsnaburins. Þegar Alphard er í súðri þá er Kaupantamastjarnan, Capella, í vestrí, og Denebola rúmlega í landsúðri. Þegar Zeta er í súðri, þá er Sjóstirnid nærri komid í vestrí. Þegar Pi er í súðri, þá er Blástjarnan nær í austri.

### 13. S e x t a n t i n n.

Sextant heitir eitt himinmælingaverkfæri; en stjornumerkid Sextantium, kallast Uraníu-Sextant, eða Uraníu-Sextángur, í minningu þess sextánga, er Tycho Brahe, hinn mikli stjornuspekingur í Dau-

mörku reyfti upp á Uraunborg á Sveeney (sjá Stjörnumfræðina bls. 210, og 211). Þetta stjörnumerki er umdurundan Regulus, en fyrir austan höfudid, lyftjuna og hjartad (Alphard) Vatnsnadarins. Það er og fyrir vestan apturfætur Stóra-Ejónsins. Fyrir utan margar smáar stjörnur er þar einungis ein fjórðu stærðar, er langt ber af hinum öllum, heitir hún í Sextúngsins. Hún er nærri beint umdurundan Regulus, og á miðjum vegi frá Regulus til Lambda Vatnsnadarins, sem einnig er þar beint umdurundan. Þessi í Sextúngsins er líka rétt austurundan Góta Vatnsnadarins. Þorfnúts og miðbangsfjærd voru um aldamótin:

F Sextúngsins.  $4 \mid 9^{\text{stund.}} 58' \mid 3,1 \mid + 0^{\circ} 36, \mid - 17,2$

#### 14. B i f a r i n n.

Frásagan um Bifarinn er hér að framan sögð umdireins og Vatnsnadarins. Bifarinn stendur á Radnum rétt umdurundan apturfótum Ejónsins. Bifarinn hallast til austurs, eru svo á honum sex stjörnur fjórðu stærðar, standandi í hálfhring, að opid snúi til austurs. Þegar byrjad er að ofanverdu, þá er Þeta efst og austast, þar vestantil Epsilon, þá Delta þar vestur og umdur, svo Gamma austur og umdur, þá Zeta austar, og lofsins Eta austar og ofar. Vestan og nedan bumb þenna, er stéttin á Bifarum; þar eru einum tvær stjörnur, mjög svo á ská, að stefnan í gegnum þær horfir upp til Regulus. Eín efri heitir Alpha Bifarsins, eða Al-

fes, fjórðu stærðar; sú nedri, Beta Bifarsins, einuig fjórðu stærðar. Fyrir vestan og ofan Alfes er ein nú hin þriðja á stéttinni, heitir Ny Bifarsins, (4). Þorkuúts og miðbangsfjærdir þessara stjarna voru um aldamótin þannig:

Ny . . . . .	4	10	stund. 40'	2,9	—	15°	9'	+	18,8
Alpha, Alfes . . .	4	10	— 50	2,9	—	17	14	+	19,1
Beta . . . . .	3.	4	11 — 2	2,9	—	21	44	+	19,4
Delta . . . . .	3.	4	11 — 9	2,9	—	13	42	+	19,5
Epsilon . . . . .	5	11	— 14	3,0	—	9	46	+	19,6
Gamma . . . . .	4	11	— 15	3,0	—	16	35	+	19,6
Peta . . . . .	4	11	— 27	3,0	—	8	42	+	19,8
Zeta . . . . .	4	11	— 55	3,0	—	17	14	+	19,9
Eta . . . . .	5	11	— 46	3,0	—	16	2	+	20,0

Þegar Bifarinn er í háfudri, þá er Bellatrix í vestri, og Algenib og Medúsuhöfudid í útnordri.

### 15. G r a f n i n n.

Sagan af Grafnum er áður sögd, þar sem talad var um Batusuadinn. Grafnum stendur lífa á Nadinum. Fyrir austan Bifarinn í suðvestur frá Meyar-Urinni, eru fjórar stjörnur þekktanlegar, er mynda stakkerhyrning eða tígul. Þær tvær efri: Delta (Algorab) þriðju stærðar, og Gamma (3) þar vestan og nedan, standa í beinni línu við Meyar-Urid; þær eru á Grafsvægunum. Fyrir nedan þessar tvær eru aðrar tvær: Beta (3) niðrundan Algorab, og Alpha (4) Alchiba, hin nedri, niður undan Gamma, þó lítið vestar. Þessar Beta og Alpha gjöra beinu línu með Ríffa fydri í Metaskála-merki. En ofantil við Alchiba er einn stjarna

Epšilon (4), á stefnummi til Gamma. Alpha er á nefinu, Epšilon á höfðinu, og Beta á flónni. Þorfnúts- og miðbangsfjærdir voru þar um aldamótin þessar:

Alpha, Alchiba	4	11 stund 58'	3,1	— 23 <sup>o</sup> 37,	+ 20,0
Epšilon. . . . .	3	12 — 0	3,0	— 21 31	+ 20,2
Gamma . . . . .	3	12 — 6	3,1	— 16 26	+ 20,0
Delta . . . . .	3	12 — 20	3,1	— 15 24	+ 20,2
Beta . . . . .	3	12 — 24	3,1	— 22 18	+ 19,9

Grafuinn er í hásubri þegar Sjostirnuid er í útneordri.

## 16. L o p t s f í p i d.

Þetta merki er af stjörnuumeistara Valande nefut í minningu Mongolfiers, er fann uppá því, að sigla í loftinu. Það er fyrir neðan kvíð Steingeitarinnar, og er frá Íslandi ekki sjáanlegt nema efsti kollurinn af belg þeim, neðan í hvorjum báturinn hængir. Þarabanki eru þær stjörnur einungis sjöttu stærðar, og niðurbíð sjóndeildarhring í hásubri, og það þarabanki einungis að sjá frá suðurströnd landsins. Þyfir mér því ekki vert að segja frá Loftskipinu frammar.

## 17. E i n v e r u f u g l i n n.

Þenna indverska fugl hefur stjörnufræðingurinn Monnier myndad neðan syðri Metastálinna og ofan hala Vatnsradarins. Á bríngu fugls þessa stendur ein stjarna þriðju eða fjórðu stærðar, er heitir Gamma eða Zubanalkravi. Hún er niðurbíð Íóta í Metastálinum, álíka langt sem Íóta er

frá Ríffa sybri. Þorknúts = og miðbangsffærd hennar var um aldamótin þannig:

Zubanalfrævi 3. 4 | 14 stund. 52' | 3,5" | — 24°-29' | + 14,6  
 Einverufuglinn er í háfudri frá því stjörnutímuni er 14 stundir, og til þess haun er 15 stundir.

### 18. R o t t u r i n n.

Þetta stjörnumerki er fyrir neðan Vatnsnabinnu; fer að ganga í miðdagshring þegar Alþarð fer þadan, og fer úr miðdagshringi þegar stjörnutímuni er 10 stundir og 16 mínútur. Það hefur einungis mjög smáar stjörnur, fimmtu stærðar og þadan af minni.

### S i m m t a g r e i n

um

húð íslenska himinhvolf á hverri stundu stjörnu-  
 dagsins.

Talning merkjanna er hér ætíð byrjuð í hálópti eða yfir hvirfli, og þadan halðid áfram niður að fjórðeildarhringi.

Þegar stjörnutímuni er:

0 S t u n d i r,

Þá eru þessi stjörnumerki í

landnordri: Cassiopea, Binnidargættirinn, Tigris-  
 brú og Krabbinn.

3 austri: Cassiopea, Perseus, Skumadurinn, Ura-  
 hornin, (Beteigeuze).

- Í landsfudri: Cassiopea, Alamaf, Prihyrningarnir,  
 Flugan, Grúturinn (Meufar).  
 Í fudri: Cassiopea, Andromeda, (Sirrah) Pegasus,  
 (Algenib) Hvalurinn.  
 Í útsfudri: Cassiopea, Cepheus, Fríðriksheidur, Fer-  
 fætla, Fölinn, Vatnsberans vestari hönd.  
 Í vestri: Cassiopea, Cepheus, Svansvangur, Harp-  
 an, Róngsurinn.  
 Í útnordri: Cassiopea, Cepheus, Drekin, Múrkvad-  
 ranturinn, Norðurfórúan.  
 Í nordri: Cassiopea, Vinvíðargættirinn, Minni-Björn,  
 Norður-Drekin, Stóri-Björninn, Bernifuhaddur.  
 Þegar stjörnutíminu er:

# 1. S t u n d

Þá er:

- Í landnordri: Kassiopea, Vinvíðargættirinn, Greindýrid,  
 Kamelpardus, Stóra-Bjarnar nasir og flær (Góta  
 og Kappa), Minna-Ljós höfudid og Stóra-Ljós  
 höfudid.  
 Í austri: Kassiopea, Vinvíðargættir, Kamelpardus,  
 (Raupamaunnastjarnan) Skumadurinn, Tvíbur-  
 anna fætur, Einhýrningurinn.  
 Í landsfudri: Kassiopea, Perseus, Medúsuhöfudid,  
 (Algol) Urinn, (Sjóstirnib) Eridanus, Veldis-  
 sprottinn.  
 Í fudri: Kassiopea, Andrómeda, (Mirach) Myrdri-  
 fístur, Fiskabandid, Hvalurinn.  
 Í útsfudri Kassiopea, Fríðriksheidur, Pegasus-háls,  
 Vatnsberinn, Steingeitar-sporður.



3 vestri: Kassiopæa, Cephensar kóróna, Svannurinn (Deneb), Gæsin, Refurinn, Arnarsængirnir, Antinós.

3 útnordri: Kassiopæa, Cephens, Norðurdrefinn, Herfules.

3 nordri: Kassiopæa, Binsidargætirinn, Minni-Björninn, Norðurdrefinn, Veidihundarnir, Berni-fuhabbur.

Pegar stjöruntíminn er:

## 2. s t u n d i r

þá er

3 landnordri: Kassiopæa, Kamelpardus, Drekahallinn, Stóra-Bjarnar höfudid, Minna-Ljónid, Stóra-Ljónid.

3 austri: Kassiopæa, Kamelpardus, Tigrisdýrid, Herschels sjónpipan, Easler og Pollur, Krabbaflær.

3 landsudri: Kassiopæa, Persens, Urinn, Orion (Rigel), Hérans höfud.

3 sudri: Kassiopæa, Andrómeda, Grútshornid, Fiska-hnútnurinn, Hvalurinn.

3 útsudri: Kassiopæa, Andrómedu hægri handleggur og höfud (Sirrah), Pegasusvængur, Sydri-Fiskurinn í Fiskamerki, Vatnsbera flóðid.

3 vestri: Kassiopæa, Fridriksheidur, Ferfætlan, Svannurinn, Hofrúngurinn, Antinós.

3 útsudri: Kassiopæa, Cephens, Norðurdrefinn, Herfulesar anstara kné og handleggur.

3 nordri: Kassiopæa, Minni-Björninn, Verðirnir, Rantamaunseins vestri hend.

## 3. s t u n d i r

- 3 landnordri: Vinvidargætirinn, Kamelpardus, Stóri-Björninn, Stóra-Ejóns halinn
- 3 austri: Vinvidargætirinn, Kamelpardus, Tigris-dýrid, Krabbinn, (Jatan og Asnarnir).
- 3 landsudri: Vinvidargætirinn, Kamelpardus, Skumadurinn (Kaupamannastjarnan), Urahornid, Orion (Beteigunze), Sérinn.
- 3 suðri: Vinvidargætirinn, Kamelpardus, Perseus (Algenib), Medúsu höfud, Gráts rófan, Hvals-höfundid (Menkar), Eridanus.
- 3 útsuðri: Vinvidargætirinn, Kamelpardus, Perseusar höfud, Andrómeda (Mirad), Myrdri-Fiskur í Fiskamerki, Fiskabandid.
- 3 vestri: Vinvidargætirinn, Kassiopea, Frídríks-heidur, Ferfætlau, Pegasus fætur (Enif), Fölinn.
- 3 útnordri: Vinvidargætirinn, Kassiopea, Cepheusar belti og hönd, Svansvængur, Harpan (Blástjarnan), Cerberus.
- 3 nordri: Vinvidargætirinn, Verdirnir, Drefinn, Márkvadranturinn, Nantamadurinn (Nekkar).

## 4. s t u n d i r

- 3 landnordri: Kamelpardus, Stóri-Björn (Dubhe og Phecda), Chara, Bernifuhaddur.
- 3 austri: Kamelpardus, Tigrisdýrid, Ejónid, Sertugurinn.
- 3 landsudri: Kamelpardus, Skumadurinn (Menkaliman), Tvíburanna fætur, Einhyrnings höfundid, Stóri-Hundurinn.

- Í súðri: Kamelpardus, Perseus, Urinn (Regustjorn-  
urnar), Eridanus.  
 Í útsúðri: Kamelpardus, Perseus, Andrómeda (Al-  
maf), Þráts hornin, Fiskabandit, Hvalurinn.  
 Í vestri: Kamelpardus, Kassiopea, Fríðriksheidur,  
Pegasus (Sheat), Pegasusar háls og höfuð.  
 Í útuordri: Kamelpardus, Kassiopea, Cepheus,  
Svanurinn (Albireo), Gæsin, Drin.  
 Í nordri: Kamelpardus, Freindýrid, Minni-Björn-  
inn, Drekin, Múrfvadranturinn, Herfúlesar fót-  
ur, Norðurfórónan.

### 5. s t u n d i r

- Í landnordri: Kamelpardus, Stóri-Björn, Asteri-  
on, Chara, Nantamaburinn (Arcturus).  
 Í austri: Kamelpardus, Stóra-Bjarnarins fram-  
fætur, Minna-Bjónid, Stóra-Bjónid.  
 Í landsúðri: Kamelpardus, Herschels sjónpipa,  
Castor og Pollús, Minni-Hundurinn, Einhýrn-  
ingurinn.  
 Í súðri: Kamelpardus, Skumaburinn (Raupamanna-  
stjarnan), Urahornin, Orion (Bellatrix, Rigel),  
Hérinn.  
 Í útsúðri: Kamelpardus, Perseus, Medúsa höfuðið,  
Flugan, Grúturinn, Hvalurinn.  
 Í vestri: Kamelpardus, Andrómeda (Sirrah), Pe-  
gasusar vængur, Syðri-Fiskurinn í Fiskamerfi.  
 Í útuordri: Kamelpardus, Freindýrid, Cepheusar  
fóróna, Svans vængurinn eystri, Refurinn.  
 Í nordri: Kamelpardus, Freindýrid, Minni-Björn-

inn (Moudulstjarnan), Norðurdrefinn, (Alvaib),  
 Herkúlesar fótur og handleggur, sem snýr að  
 Blásthjórnunni.

## 6. s t u n d i r.

Í landnordri: Kamelpardus, Norðurdrefans hali,  
 Nautamaturinn.

Í austri: Kamelpardus, Stóra-Bjarnar bringa og  
 apturfætur, Ljóuanna halar bádir (Denebola),  
 Meyariunar háls.

Í landfudri: Kamelpardus, Tigrisdýrsins hofud og  
 háls, Asuarnir, Jatan og flærnar Krabbans,  
 Vatnsnadarins hofud, Einhyrningurinn.

Í fudri: Kamelpardus, Tigrisdýrsins hofud, Her-  
 schels sjónpípa, Castors fætur, Einhyrningsins  
 nasir, Sérinn.

Í útufudri: Kamelpardus, Dfumaturinn, Perseusar  
 fætur, Uriinn (Sjostirnib), Hvalurinn.

Í vestri: Kamelpardus, Andrómeda, (Mirach), Pe-  
 gasus (Algenib), Fiskabandib.

Í útnordri: Kamelpardus, Kassiopea, Cepheus (Fó-  
 rónan), Fridriksheidur, Ferfætlan, Svansvængur.

Í nordri: Kamelpardus, Greindýr, Minni-Björn,  
 Norðurdrefinn, Drefahofudib, Herkúlesar kné og  
 handleggur.

## 7. s t u n d i r

Í landnordri: Kamelpardus, Stóri-Björn, Nord-  
 urdrefinn, Múrkvadranturinn, Norðurfórónan,  
 Nadarhofudib Nadurvalda.

- Í austri: Kamelpardus, Stóri-Björn, Bernifurhaddur, Meyarinnar efri haudleggur.  
 Í landsudri: Kamelpardus, Stóra-Bjarnar framfótar klær, Stóra-Ejóns höfundid Sertungurinn, Vatnsgnadirinn.  
 Í sudri: Kamelpardus, Tigrisdýr, Herschels sjónpípa, Tvíburamerkid, Einhyrningins háls, Stóri-Gundurinn (Sirius).  
 Í útsudri: Kamelpardus, Skumadurinn (Raupamannastjarna) Nramerkid (Aldebaran), Eridannus.  
 Í vestri: Kamelpardus, Persens (Algenib), Prihyrningarnir, Grútshornin, Fiskabauid.  
 Í útnordri: Kamelpardus, Kassiopea, Fridriksheidur, Pegasus.  
 Í nordri: Kamelpardus, Minni-Björn, Nordur-drefinn, Harpan.

## 8. s t u n d i r

- Í landnordri: Stóra-Bjarnar höfundid, Drekin, Múrkvadrantur, Herkules.  
 Í austri: Stóra-Bjarnar höfundid, Stóri-Björninn, Chara, Rautamannusins fótur, Meyarmerkid.  
 Í landsudri: Stóra-Bjarnar höfundid, Stóri-Björninn, Minna-Ejónid, Stóra-Ejónid, Bifarinn.  
 Í sudri: Stóra-Bjarnar höfundid, Tigrisdýr, Krabbinn, Einhyrningurinn, Prentsmidjan.  
 Í útsudri: Stóra-Bjarnar höfundid, Tigrisdýrid, Herschels sjónpípan, Skumadurinn, Orion (Bellatrix), Eridannus, Veldispretinn.

- Í vestri: Stóra = Bjarnar höfudid, Kamelpardus, Persens, Gráturinn, Hvalurinn.
- Í útnordri: Stóra = Bjarnar höfudid, Kamelpardus, Cassiopea, Andrómeda, Pegasus.
- Í nordri: Stóra = Bjarnar höfudid, Kamelpardus, Minni = Björn, Cepheus, Svanurinn, Refurinn.

### 9. s t u n d i r

- Í landuordri: Stóra = Bjarnar höfudid, Nordurdrekinn, Herfules, Cerberus.
- Í austri: Stóra = Bjarnar höfudid, Stóri = Vagninn, Asterion, Rantamadrinn (Areturus), Mænalfjallid.
- Í landsudri: Stóra = Bjarnar höfudid, hans aptursetur, Eðnshalinn, Meyar höfudid, Hrafnusins vængur.
- Í sudri: Stóra = Bjarnar höfudid og framsætturnir, Tigrisdýrid, Krabbinn, Vatnsnadrinn (Alphard).
- Í útnordri: Stóra = Bjarnar höfudid, Tigrisdýrid, Hersehels sjónpípan, Tvíburamerkið, Einhyrnings höfudid, Hérinn.
- Í vestri: Stóra = Bjarnar höfudid, Tigrisdýrid, Skumadrinn, (Raupamannastjarna) Urinn (Sjostirnir), Hvalshöfudid.
- Í útnordri: Stóra = Bjarnar höfudid, Kamelpardus, Cassiopea, Andrómeda.
- Í nordri: Stóra = Bjarnar höfudid, Kamelpardus, Minni = Björn, Cepheus, Svanurinn.

## 10. s t u n d i r

Í landnordri: Stóra = Bjarnar háls, Drefinn, Verðirnis, Drefinn, Harpan (Blástjarnan).

Í austri: Stóra = Bjarnar háls, Vagninn, Nautamalurinn, Nalurvalda = Nalurinn.

Í landnordri: Stóra = Bjarnar háls, Stóri Vagninn, Chara, Bernifuhaddur, Megin (Meyar = Arid).

Í suðri: Stóra = Bjarnar háls, hans fremri apturfótaklar, hofubú á Þjónumum (Regulus), Serþingurinn, Vatnsnalurinn, Rotturinn.

Í útnordri: Stóra = Bjarnar háls, hans framfótaklar, Tigrisbýr, Pollur, Minni = Hundur, Stóri = Hundur (Sirius).

Í vestri: Stóra = Bjarnar háls, Tigrisbýr, Herschels sjónpipan, Skumalurinn, Urans efra horn.

Í útnordri: Stóra = Bjarnar háls, Camelpardus, Perseus (Algenib), Alamað, Gráts hornin.

Í nordri: Stóra = Bjarnar háls, Norðurdrefinn, Minni = Björn, Cepheus, Ferfætlan, Pegasus.

## 11. s t u n d i r

Í landnordri: Stóra = Bjarnar herðar, Norðurdrefinn, Verðirnis, Norðurdrefinn, Svaurinn, Refurinn.

Í austri: Stóra = Bjarnar herðar (Dubhe), Norðurdrefinn, Múrfvadranturinn, Herskules, Nalurvaldi.

Í landsuðri: Stóra = Bjarnar herðar, Stóri Vagninn, Nautamaunsins vestari fótur, Meyarmerkið.

Í suðri: Stóra = Bjarnar herðar (Dubhe), hans apt-

ursetur, Minna = Ejónid, Stóra = Ejónid, Bifariinn.

3 útsudri: Stóra = Bjarnar herdar, framsetur, Tigrisdýrid, Asuarnir og Jatan, Vatnsnaburinn, Einhýrningurinn, Prentsmidjan.

3 vestri: Stóra = Bjarnar herdar, Tigrisdýr, Herschels sjónpipan, Tvíburarnir, Orions andlit og arlir.

3 útnordri: Stóra = Bjarnar herdar, hans höfud, Camelpardus, Persens, Medúshöfud (Algol), Flugan, Gráturinn.

3 nordri: Stóra = Bjarnar herdar, Camelpardus, Freindýrid, Cepheus, Fridriksheidur.

## 12. s t u n d i r

3 landnordri: Stóra = Bjarnar bak, Nordurdrefinn, Verdirnir, Nordurdrefinn, Svannurinn, Refurinn.

3 austri: Stóra = Bjarnar bak, Nordurdrefinn, Múr kvadranturinn, Herkules, Kóngsurinn.

3 landsudri: Stóra = Bjarnar bak, Stóri = Bagninn, Nautamaburinn, Mænalsjall, Metastálir (Ríffa).

3 sudri: Stóra = Bjarnar bak, Stóri Bagninn, Beði = hundar, Bernifuhaddur, Meyarmerkið, Hrafninn.

3 útsudri: Stóra = Bjarnar bak, Stóri = Bagninn, Minna = Ejónid, Stóra = Ejónid, Vatnsnaburinn (Alphard), Prentsmidjan.

3 vestri: Stóra = Bjarnar bak, hans framsetur, Tigrisdýrid, Herschels sjónpipa, Castor, Einhýrningsins höfud.



3 útnordri: Stóra · Bjarnar bak, hans höfud, Tigrisdýrs höfudid, Camelpardusar fætur, Perseusar fætur (Sjöstirnid), Þrúturinn.

3 nordri: Stóra = Bjarnar bak, Nordurdrefinn, Greindýrid, Cassiopea, Andrómeda (Sirrah).

### 13. s t u n d i r

3 laudnordri: Nordurdrefans hali, Verdirnir, Nordurdrefinn, Cepheus, Svansins stjöl, Pegasus.

3 austri: Nordurdrefans hali, búfur hans, Herfulesar eystra kné, Cerberus, Arnarvængirnir.

3 landsubdri: Nordurdrefans hali, Nautamadurinn, Nordurkórónan, Nalurvalda nadorinn, Sporddrefinn.

3 subdri, Nordurdrefans hali, Stóri-Baguinn, Beidihundarnir, Bernifuhaddur, Meyarmerki (Vindemiatrix), (Meyar-Urid), Vatnsnadorinn.

3 útsubdri: Nordurdrefans hali, Stóri-Baguinn, Stóra = Bjarnarins apturfætur, Minna = Þjóns halinn, Stóra = Þjóns búfurinn, Sertúngurinn, Vatnsnadorinn, Rotturinn.

3 vestri: Nordurdrefans hali, Dubhe í Stóra-Bagni, Stóra = Bjarnarins framsætur, Tigrisdýrid, Tviburamerkid, Minni-Hundurinn.

3 útnordri: Nordurdrefans hali, Stóra = Bjarnarins höfud, Tigrisdýrsins höfud, Skumadurinn (Kaupamannastjarnan), Uraus eyru.

3 nordri: Nordurdrefans hali, Stóra = Greindýrid, Cassiopea, Andrómeda (Mirah), Myrdri = Fiskurinn í Fiskamerki.

## 14. s t u n d i r

- 3 landnordri: Alpha í Nordurdrefa (þ. e. Thuban), Verðirnir, Nordurdrefinn, Cepheus, Fersætlan, Pegasus.
- 3 austri: Alpha í Nordurdrefa, Drefans búfur og höfund, Harpan (Blástjarnan), Gæsin, Drin, Drinn (Althair), Antinóus.
- 3 landsudri: Alpha í Nordurdrefa, Múrkvadranturinn, Herkules, Radurvaldi.
- 3 sudri: Alpha í Nordurdrefa, Nautamanns vestri hönd, Nautamadurinn (Areturus), Meyarinnar fatbrýðing, Einverufuglinn.
- 3 útsudri, Alpha í Nordurdrefa, Zeta í Stóra-Bagni: Beidihundarnir, Stóra = Ljóns haliinn (Denebola), Bifarinn.
- 3 vestri: Alpha í Nordurdrefa, Beta í Stóra-Bagni, Lambda og My Stóra = Bjarnar, höfundid á þríminna og stærra Ljóni, Satan og Ásnarnir í Krabbanum.
- 3 útnordri: Alpha í Nordurdrefa, Stóra = Bjarnar höfundid, Tigrisbýrid, Herschels sjónpípa, Skumadurinn, Urans horn.
- 3 nordri: Alpha í Nordurdrefa, Verðirnir, Greindýrid, Cassiopea, Perseus, Andrómeda (Alamak), Prihyrningarnir.

## 15. s t u n d i r

- 3 landnordri: Minna = Bjarnar höfundid, Nordurdrefinn, Cepheus, Fridriksheidur, Andrómeda (Sirrah).

- Í austri: Minna = Bjarnar höfundur, Nordurdrefans  
 höfundur, Svanurinn, Höfrúgurinn, Föllun.  
 Í landsudri: Minna = Bjarnar höfundur, Nordurdref-  
 inn, Múrfvadranturinn, Herfules, Cerberus,  
 Stöngsurinn, Níðarspordur, Sobieskys stjöldur.  
 Í sudri: Minna = Bjarnar höfundur, Nautamadrinn,  
 Mænalusfjall, Metaskálamerki, (Ríssa nýrdri),  
 Einverufuglinn.  
 Í útsudri: Minna = Bjarnar höfundur, Nautamannsins  
 tanmar, Bernifuhaddur, Meyarmerki, Bifar og  
 Grafn.  
 Í vestri: Minna = Bjarnar höfundur, Alpha í Nord-  
 urdrefa, Gamma og Delta í Stóra = Birni, Minna =  
 Újóns búfurinn og Stóra = Újóns höfundur, Vatns-  
 nadrinn.  
 Í útnordri: Minna = Bjarnar höfundur, Nordurdref-  
 ans hali, Stóra = Bjarnar höfundur, Tigrisdýrid,  
 Herschels sjónpipa, Tviburamerkið.  
 Í nordri: Minna = Bjarnar höfundur, Verdirnir,  
 Greindýrid, Perseus (Allgenib), Medúsa höfundur.

#### 16. s t u n d i r

- Í landnordri: Minna = Bjarnar fatur, Nordurdref-  
 inn, Cepheus, Cassiopea, Andrómeda (Mirad),  
 Nýrdri = Fiskurinn í Fiskamerkinu.  
 Í austri: Minna = Bjarnar fatur, Nordurdrefinn,  
 Svanurinn (Deneb), Pegasusar höfundur.  
 Í landsudri: Minna = Bjarnar fatur, Nordurdref-  
 ans höfundur, Harpan, Arnarvængirnir, Antinóus,  
 Sobieskys stjöldur.

- Í súdri: Minna = Bjarnarins fatur, Nordurdrefinn,  
 Múrfvadranturinn, Herfules, Radurvaldi, Sperd-  
 drefinn (Alrab).  
 Í útsúdri: Minna = Bjarnar fatur, Nordurdrefinn,  
 Nautamadurinn, Meyarmerkið, (Meyar=Arid).  
 Í vestri: Minna = Bjarnar fatur, Alpha Nordur-  
 drefans, Epsilon Stóra-Bjarnar, Minna = Ljóns  
 halinn: Stóra = Ljóns búfurinn.  
 Í útnordri: Minna = Bjarnarins fatur, Nordur-  
 drefans hali, Stóra = Bjarnarins háls, Tigris-  
 dhrid, Castor og Pollúr.  
 Í nordri, Minna=Bjarnarins fatur, Camelpardus,  
 Perseus, Uramerki.

### 17. s t u n d i r

- Í landnordri: Zeta Nordurdrefans, Sólbrautar-  
 mondbull, Nordurdrefinn, Cepheus, Cassiopea, An-  
 dróméda, Prihyrningar, Grútshornin.  
 Í austri: Zeta Nordurdrefans, Sólbrautarmondbull,  
 Nordurdrefinn, Svannurinn, Pegasus.  
 Í landnordri: Zeta Nordurdrefans, Drekahöfudid,  
 Harpan, Gæsin, Drin, Drnin, Antinóus, Stein-  
 geitarhornid.  
 Í súdri: Zeta Nordurdrefans, hans útlasandi tunga,  
 Herfules, Radurvaldi.  
 Í útsúdri: Zeta Nordurdrefans, Múrfvadrantur-  
 inn, Nautamadurinn, Mænalfjall, Meyarmerki  
 (Meyar=Arid).  
 Í vestri: Zeta Nordurdrefans, Nordurdrefinn, Eta  
 Stóra = Bjarnar eða Venetnasch í Stóra = Bagni,

Veidihundarnir (a i Chara), Stóra = Vjós halinn (Denebola).

Í útnordri: Zeta Norðurdrefans, Verðirnir, Stóra-Bjarnar hálsinn, flærnar Jóta og Rappa Bjarnarins, Tigrisdýrid, Krabbinn.

Í nordri: Zeta Norðurdrefans, Minni-Björninn, Greindýrid, Kamelpardus, Dfumadurinn (Kaupamanna stjarnan) Urahornid Beta.

### 18. Í t u n d i r

Í landnordri, Sólbrautarmondull, (eingin stjarna), Norðurdrefinn, Cepheus, Casiopea, Perseus, Flugan, Gráturinn.

Í austri, Sólbrautarmondull, Norðurdrefinn, Cepheus, Ferætlan, Fridriksheidur, Pegasus (Scheat), Fiskamerfi.

Í landsudri: Sólbrautarmondull, Norðurdrefi, Svanurinn, Refurinn, Hofríngurinn, Fölinn, Vatnsberans hönd, (My).

Í sudri: Sólbrautarmondull, Norðurdrefahöfudid, Harpan, Cerberus, Róngsurinn, Nafarsins hali.

Í útsudri: Sólbrautarmondull, Múrfvadranturinn, Herfulesar fótur, Norðurfórónan, Nafurvalda nafurinn, Metastálamerfi.

Í vestri: Sólbrautarmondull, Norðurdrefinn, Nautamannsins taumar eða hönd hvar i hann heldur veidihundunum, Veidihundarnir, Bernifuhaddur, Meyarmerfi.

Í útnordri: Sólbrautarmondull, Norðurdrefinn,

Verðirnir, Nordurdrefinn, Stóri-Bagninn (Beta),  
Bjarnarflóin, Lambda og My, Minna = Ljóns  
hofudid, Stóra = Ljóns hofudid.

3 nordri: Sólbrautarmondull, Nordurdrefi, Minni-  
Björn, Greindýrid, Camelpardus, Tigrisdýrid,  
Herschels sjónpipa, Tviburamerfid.

### 19. s t u n d i r

3 landnordri: Þi Nordurdrefans, Cepheus, Casio-  
pea, Persens (Algenib), Uramerfid (Sjóstirnir).

3 austri: Þi Nordurdrefans, Cepheus, Fríðriks-  
heidur, Andromeda, Fiskabandid.

3 landsudri: Þi Nordurdrefans, Svannurinn (De-  
ueb) Pegasus (Enif), Vatnsberans stjóla.

3 landsudri: Þi Nordurdrefans, Svansvængur,  
Harpan, Arnarvængirnir, Antinós, Bogmad-  
urinn.

3 útsudri: Þi Nordurdrefans, Nordurdrefa hofud-  
id, Herkúles, Madurvaldi, Sporddrefi.

3 vestri: Þi Nordurdrefans, Sólbrautarmondull,  
Márkvadranturinn, Nantamadurinn.

3 útnordri: Þi Nordurdrefans, Verðirnir, Stóri  
Bagninn (Gamma), Stóra-Bjarnarins lær (Psi),  
Minna = Ljónid, Stóra = Ljónid (Gamma).

3 nordri: Þi Nordurdrefans, Minni Björninn,  
Camelpardus, Tigrisdýrid, Herschels sjónpipa,  
Tviburamerfid, (Castor).

### 20. s t u n d i r

3 Landnordri: Þi Nordurdrefans, Cepheus, Cas-  
siopea, Camelpardus, Persens, Urahorn.

- Í austri: Rho Nordurdrefans, Cepheus, Cassiopea, Andrómeda, (Mirach), Myrdri Fiskurinn í Fiska-  
 merki, Fiskanna hnútur.  
 Í landsudri: Rho Nordurdrefans, Cepheus, Evans-  
 ins stjél, Pegasusar háls, Vatnsbera flóðid.  
 Í sudri: Rho Nordurdrefans, Cepheusar hönd,  
 Svanurinn, Refurinn, Drinn, Antinóus, Stein-  
 geit.  
 Í útsudri: Rho Nordurdrefans, Harpan (Blá-  
 stjarnan), Cerberus, Nafurvaldiinn (Nas Allha-  
 gue), Sporddrefinn.  
 Í vestri: Rho Nordurdrefans, Sólbrantarmóndull,  
 Márkvadrantur, Hercules, Nantamabur, Mæn-  
 alfjall.  
 Í sitnordri: Rho Nordurdrefans, Verðirnir, Stóri-  
 Þaginn (Epsilon), Þjónshaliinn.  
 Í uordri: Rho Nordurdrefans, Minni Þjorninn,  
 Stóra-Þjarnar höfuðid, Tigrisdýrid, Krabb-  
 ans flær.

## 21. s t u n d

- Í landnordri: Alderamin, Cassiopea, Camelpard-  
 us, Þumabur (kaupamaustjarna), Tvibur-  
 anna fatur.  
 Í austri: Alderamin, Cassiopea, Andrómeda, (Ma-  
 maf), Þríhyrningarnir, Flugan, Þrúturinn, Sval-  
 urinn, (Menfar).  
 Í landsudri: Alderamin, Cepheusar Rórona, Þrid-  
 ríksheiburinn, Pegasus, Þorknúturinn, Sválsins  
 spordur.

- Í subrí: Alderamin, Svannurinn, Refsurinn, Foliinn,  
 Vatnsberans vestari handleggur.  
 Í útsubrí: Alderamin, Svannurinn, Harpan, Arn-  
 arinnar vængur, Kóngsurinn, Nádurvalda aust-  
 ari hönd.  
 Í vestrí: Alderamin, Norðurdrefans höfud, Her-  
 kúles, Norðurkórónan, Nádurvalda = Nádurinn.  
 Í útíndrí: Alderamin, Norðurdrefinn, Stóri-Vagn-  
 inn (Mizar), Veidihundarnir, Bernifuhabbur.  
 Í norðrí: Alderamin, Minni-Björn, Stóra-Bjarn-  
 ar höfud, hans klær, Jóta og Kappa, Minna-  
 Ljónid, Stóra-Ljónid.

## 22. Í T U N D I R

- Í landnordrí: Cepheusar brjóst, Freindýrid, Ca-  
 melpardus, Tigrisdýrid, Herschels sjónpípa, Lvi-  
 buramerfid.  
 Í austrí: Cepheusar brjóst, Cassiopea, Persens,  
 Medúsa höfud, Uramerfid, (Sjóstirnir).  
 Í landsubrí: Cepheusar brjóst, Fridriksheidurinn,  
 Andrómeda, Fiskabandid, Hvalurinn.  
 Í subrí: Cepheusar brjóst, Cepheusar kóróna, Fer-  
 sætlan, Pegasus, Vatnsberinn (Ancha).  
 Í útsubrí: Cepheusar brjóst, Svannurinn (Deneb),  
 Gæsin, Drinn, Antinós, Sobjeshs stjöldur.  
 Í vestrí: Cepheusar brjóst, Norðurdrefans höfud,  
 Herkúles, Nádurvaldi.  
 Í útíndrí: Cepheusar brjóst, Norðurdrefinn, Nauta-  
 madurinn, Bernifuhabbur.  
 Í norðrí: Cepheusar brjóst, Minni-Björninn, Stóra-



Bjarnarins háló, Bjarnar flóin Lambda og My,  
Minna-Ljóns höfudid, Stóra-Ljóns höfudid.

### 23. s t u n d i r

I landnordri: Binvidargætirinn, Kamelparbus, Tigrisdýrs höfud, Herschels sjónpipa, Castor og Pollár, Krabbamerki.

I austri: Cepheusar hægri handleggur, Cassiopea, Perseus, (Miraf), Uramerki, Orions skjöldur eða Ljónshúd.

I landsudri: Cepheusar hægri handleggur, Cassiopea, Andrómeda (Mirach), Grúts höfudid, Fífl-anna hnútur, Hvalurinn.

I sudri: Cepheusar hægri handleggur, Frídríksheidur, Pegasus, (Scheat og Markab), Vatnsbera-Flóðid.

I útudri: Cepheusar hægri handleggur, Svanurinn, Refurinn, Hófrúngurinn, Steingeitarhornid.

I vestri: Cepheusar hægri handleggur, hans vinstri handleggur, Svanurinn, Cerberus, Nafurvaldi.

I útnordri: Cepheusar hægri handleggur, Drefinn, Sólbrautarmundull, Drefinn, Márkvadranturinn, Rautamadrinn (Arcturus).

I nordri: Cepheusar hægri handleggur, Minni-Björn, Drefinn, Stóri-Bagninn, (Dubhe og Merak) Stóra-Bjarnarins aptursætur (Psi), Litla-Ljóns halinn, Stóra-Ljónid.

### 24. s t u n d i r

er sama sem 0 stundir, því þá er hringurinn kom-

inu í fríng, og vísaft því lesarannum þángað. Þessar stundir eru stundir stjörundagsins, eða stjörnutímunn sjálfur, og reiknaft hann frá þeim tíma er vorfnúturinn er í háfudri (Samber Stjörnufræðina blf. 193). Það er því 0 stundir eða 24 stundir þegar vorfnúturinn er í háfudri, 6 stundir þegar hann er í vestri, 12 stundir þegar hann er í norðri, og 18 stundir þegar hann er í austri. Við þessa töblu er það aðgætanda, að á hverri stundu, og í sérhverri átt er byrjad í hvirfilstab að telja stjörnumerkin, og síðan halðið áfram eptir röð þeirra niður að sjóndeildarhringi. Þar af kénur það, að í öllum áttunum nefnið fyrst sama stjörnumerkið, því, hvorninu sem maður snýr sér, þá er á sama augnablifinu sama stjörnumerki yfir hvirfli. Þess vegna má svo að orði kveda, að það stjörnumerki sé í öllum áttum undir eins. Aftur á móti, vilji menn vita, hvor merki séu á sjóndeildarhringi á hverri stundu, þá þarf ei annað, enn safna þeim merkjum sem seinast eru talin í hverri átt á sömu stundu, þó er það aðgætanda, að einhver af hinum smærri merkjum kunna á milli verða, þar sjóndeildarhringnum er hér einúngis skipt í 8 parta.

#### Um brúfun þessarar töblu.

Alt er hér undir því komið, að maður viti hvor stjörnuftund sé, og það getur maður með hmsu móti, svo sem af átt Sjóstirnisisins eptir töblunni í Ev. 1. b. blf. 50, þegar maður sér Sjóstirnið.

Ellegar í annann máta af átt Blá stjörnununar, þegar maður sér hana; finnur maður þá stundina eptir toblunni Lv. 1. d. bls. 47; t. d. sjái jeg Blá stjörnu í nordri, þá segir tablan að stjörnutíminn sé 6 stundir 31 mínúta; fletti jeg þá upp hvar stendur: „6 stundir“ í himinhvolfstobblunni, og les þar allar áttirnar. En vegna þess að hér voru 31 mínúta umfram stundirnar, þá vara jeg mig á því, að öll stjörnumerkin hafa þófast dálitid áfram á þeim 31 mínútum. Jeg get líka sætt því lagi að Blá stjarnan verði ekki komin í fullt nordur, og brúka jeg þar til áttavítadálkana í þessum Blá stjörnu- og Sjóstirnis-tobblum; af Blá stjörnu toblunni sé jeg að 57 mínútur líða meðan Blá stjarnan í nordurátt geingur í áttavítastrif, get jeg þá sett í þrísíðu:

57 min. — 1 Strif. — 31 min.

gjörir  $\frac{3}{4}$  strif.

En  $\frac{3}{4}$  strif er rúmlega  $\frac{1}{2}$  strif; lát jeg því Blá stjörnunna vanta  $\frac{1}{2}$  strif til að komast í nordur, og sæ jeg þannig réttar 6 stundir stjörnutímans, er himinhvolfstobblan tilgreinir.

Annar máti að finna stjörnutímann er þessi. Viti maður einhverja stjörnu í háfudri, þá er maður þekkir, og viti hennar vorfnútsfjærd eptir Leidarvísí þessum, þá er sú vorfnútsfjærd stjörnuftundin þegar sú sama stjarna er í háfudri, t. a. m. sjái jeg Arcturus í háfudri, þá er vorfnútsfjærd hans eptir Lv. 1. bls. 41. þessi 14 ft. 8 min.; veit jeg þá að stjörnutíminn er 14 ft. 8 min.

Þinn þriðji máti er að finna stjörnutímann af

sóltímanum, eða af því hvað framorðið er á sólunni, eða af flukfustundinni; þá er reglan þessi: legg vorfnútsfjærd sólarinnar við sóltímann, kemur þá stjörnutíminn. En vorfnútsfjærd sólarinnar fæst í tölunni er stendur í Lv. 1. d. bls. 48 og 49, þó að þar vanti vorfnútsfjærd. í júní og júlí mánuði. Þessar vorfnútsfjærdir er þar vanta, skrifa jeg einnig hér, handa þeim sem vilja um hásumarstímann vita afstöðu merkjanna um himinhvolfið, þó stjörnur sjáist ekki. . . . . þá er:

	vorfnf. sólar
þann 7. júní . . . . .	5 stundir 0 min.
— 22. júní . . . . .	6 — 0 —
— 6. júlí . . . . .	7 — 0 —
— 21. júlí . . . . .	8 — 0 —

Er svo aðferðin öldungis hin sama sem sýnd er í Lv. 1. d. bls. 49.

#### Dæmi:

Einhver vill vita hvornin stjörnumerkin standa um himinhvolfið þann 11ta júlí, kl. 11 f. m.

Vorfnútsfjærd sólar . . . . . 7 st. 20 min.

Sóltími 11 st. + 12 st. . 23 — 0 —  
 . 30 st. 20 min.

burtvarpa . 24  
 stjörnutími . 6 st. 20 min.

Þar 11 stundir fyrir miðdag eru 23 stundir frá undangangaða háðegi. Því næst skoda jeg himinhvolfstöbluna þar sem standa 6 stundir, og finn þar merkin í öllum áttunum. Annad dæmi: jeg vil vita stjörnumerkjanna stöðu þann 30. nóv. kl. 9 e. m.

Vorknútsfjærd sólar . . . . . 16 ft. 20 mín.

Sóltími . . . . . 9

---

25 ft. 20 m:

burtkasta . . . . . 24

---

verdur eptir . . . . . 1 ft. 20 mín.

Skoda jeg þá hvor merki talin séu i himinhvolfstóblunni, þar sem stendur „1 stund“.

# REGLISTUN

nfir

báða parta Leidarvísisins.

	Blf.
I. Yfirlit fyrra partsins . . . . .	3.
Inngangurinn . . . . .	5.
Fyrsta grein um stjörnurnar yfir höfud . . . .	5.
Önnur grein um norðurmerkin.	
1. Björn hinn mikli . . . . .	5.
2. Björn hinn minni . . . . .	12.
3. Kasíopea . . . . .	18.
4. Dreindýrid . . . . .	21.
5. Vinvidargætirinn . . . . .	21.
6. Cepheus . . . . .	22.
7. Norðurdrefinn . . . . .	24.
8. Andrómeda . . . . .	31.
9. Perseus og Medúshöfud . . . . .	34.
10. Priðyrningarnir . . . . .	36.
11. Skumadurinn . . . . .	37.
12. Kamelpardus . . . . .	38.
13. Tigrisdýrid . . . . .	39.
14. Þjón hið minna . . . . .	39.
15. Nautamalur og Mánalsfjall . . . . .	40.
16. Veidihundarnir . . . . .	44.
17. Berniskubaddur . . . . .	45.
18. Norðurfórönan . . . . .	45.

19. Harpan . . . . .	46.
Tabla yfir vorluútsfjærd sólarinnar . . . .	48.
20. Herkules . . . . .	52.
21. Nádurvaldi . . . . .	54.
22. Drn og Antinóus . . . . .	53.
23. Sobjettís stjöldur . . . . .	60.
24. Róngsurinn . . . . .	60.
25. Drin, Refsurinn, Gæsin . . . . .	61.
26. Hofrángurinn . . . . .	61.
27. Svanurinn . . . . .	62.
28. Ferfættlan . . . . .	63.
29. Pegasus . . . . .	64.
30. Fölinn . . . . .	66.
31. Friðriksheidur . . . . .	66.
32. Herschels slónpipan . . . . .	67.
33. Múrfvadrantur . . . . .	67.

## II. Yfirlit síðara partsins . . . . . 3.

### Þriðja grein um dýrareimina . . . . . 1.

1. Þrúturinn og Flugan . . . . .	4.
2. Uxinn . . . . .	9.
3. Tvíburarnir . . . . .	13.
4. Krabbinn . . . . .	20.
5. Þjónið . . . . .	22.
6. Meyin . . . . .	27.
7. Metastálmirnar . . . . .	31.
8. Sporddrekin . . . . .	33.
9. Bogamaburinn . . . . .	35.
10. Steingeitin . . . . .	37.
11. Vatnsberinn . . . . .	41.
21. Þíflarnir . . . . .	44.

### Þjóða grein um sudurmerkin . . . . . 46.

1. Þvalurinn . . . . .	46.
2. Eridanus . . . . .	49.

3. Veldisþrotinn . . . . .	51.
4. Dríon . . . . .	51.
5. Georgs þarpa . . . . .	53.
6. Þérinn . . . . .	53.
7. Stóri - Hundurinn . . . . .	54.
8. Litli - Hundurinn . . . . .	55.
9. Einhýrningurinn . . . . .	56.
10. Prentsmíðjan . . . . .	56.
11. Skipid Argð . . . . .	57.
12. Vatnshundurinn . . . . .	58.
13. Sextantinn . . . . .	59.
14. Bilarinn . . . . .	60.
15. Þrasinn . . . . .	61.
16. Loftskipid . . . . .	62.
17. Einverufuglinn . . . . .	62.
18. Rotturinn . . . . .	63.
<b>Tímmta grein um híd íslenska himinhvolf .</b>	<b>63.</b>



---

# S A N N S I A

um Þessastada skóla

fyrir skóla - árid 1845 — 1846.

---

Húsin á Þessastöðum gef eg effert um að nefna, því þegar skólinn flytst þadan, koma þau honum að líkindum effert við framfar; þeim er hvort sem er lýst í minum undanfarandi skrifum.

Eg kvabði skólan með ræðuforni þann 29da maíi s. á.; því má geta nærri, þó kannste hvorki ræða né raust hafi lýst því, að eg eigi hafi getað gjört það án viðkvæmrar tilfönn-  
ingar, því ósmargra gleðistunda hafði eg til þess notid af minum skólaskrifum í 40 ár, að eg gæti gjört það með fólbu gebi, því þó einstakt hafi sárt mig — hjá því getur einginn komist, og það er eingum gagnlegt að hvíla sífellt á róðabedi — þá er það effert að reifna á móti þeirri marg-  
fólbu gleði, sem eg af samvinnu með minum meðkenn-  
urum, skólans lærisveina framferum, elstusémi og umbyggju fyrir mér, ef þeir víðu að eitthvad að mér gefi, og marg-  
fólbu vinahótum í viðmóti og verki, sem eg hefi notid mína laungu skólaveru tíð; svo þegar eg lit nú yfir þau 41 ár, sem eg hefi við skólan verid, get eg ekki þeint mer neina gleðilegrí skóbu, sem eg hefði getað komist í, enn min þessir verid. Þessvegna, þegar eg af herra kammerherra, skiptamtanni T. Goppe, var fvaldid sama sem eg kvabði skólan, þedinn um að gegna

eitt ár enn þeim skólaskrifum sem eg þángað til hafði á þendi haft\*), gjörði eg það fúslega, en þó með tvíða fyrir því, að eg bæði vegna minnar elli, sjónþæru í flammdegi og við ljós, og lífama og sálarkrapta meiri og meiri aptursör, ekki mundi geta gegnt þeim sem ber; en eg vona að það þó hafi geingid bærléga. Maður getur eigi dæmt um þessháttar sjálfur nema til háls; að maður geti gjört öllum til þessis er ekki að ætlast til, og sá sem það ætlar sér, má óttast að hann gjöri eptir einkis stapi, því sitt lýft þverjum. Eg hefi fylgt sömu reglum þetta ár sem undanfarin, og einungis í smámunum víkib þar frá, svo vel í keiningu sem öðru, er eg hefi gjört mér í þugarlund að betur mundi fara, þó það máste ekki hafi verið svo.

Einsog undanfarin ár var til ætlað, að 40 regulegir lærifveinar skyldu í skólanum njóta kennslu, sæðis og þjónustu og annarar aðhjúfrunar þetta ár; þvörs vegnað að í það þeirra nýu, sem útskrifudust í fyrra vor, sem sjá má af toblunni B, er fylgdi skóla-skýrslu minni í fyrra, var aptur, eptir bréfi skiptprófasts A. Selgasonar R. af Dbr., sem gegnt hefir biskups verkum síðan biskup sál. Steingrímur Jónsson dó, með bréfi dags. 17da júl. 1845, skóli veittur þessum: 1) Jakob Benediktssyni, syni Benedikts sál. Jónssonar, er síðast var prestur í Hítarnesi í Mýrasýslu. 2) Þórarni Þodvarsyni, syni prófasts fira Þodvars Þorvaldesonar á Melstað í Húnavatnsýslu. 3) Sigurgeiri Jakobsyni, syni umbodshaldara og þreppstjóra Jakobs Péturssonar á Breidunýri í syðri Þingeyarsýslu. 4) Eggert M. Vaage, syni þreppstjóra og skiphera Magnúsar Vaage á Bogum í Gullbringusýslu. 5) Birni Péturssyni, syni Péturs Jónssonar prests á Berufirði í Sudarmálasýslu. 6) Germanniusi Eliasi Jónssyni, syni verslunarforstjóra

\*) Dr. theol. Sv. Egilsson var ætlað til að siglbi, sem og stéði; en málfræðingur, þerra Gísli Magnússon var feinginn til að kenna þar lærðómsgreinir, er Dr. Egilsson hefir kennt.

(factor) Jóns sál. Jónsónar á Þasfirði. 7) Skúla Gísla-  
syni; syni prests síra Gísla Gíslasonar á Vesturböðvöllum í  
Dúnavatnshöfðu. 8) Jóni Þorkellsyni, syni Þorkells sál.  
Jónsónar, bónda á Sólhelnum í Glaumbæarsöku í Staga-  
fjardarsölu. Lokins um jólatíman var 9) Carl Christ-  
jan Þorvaldur Andersen, sem frá 1ta október hafði sem  
aukalarisveinn notib fríennslu í skólanum, iantekinn sem reglu-  
legur lærisveinn, því um þar mundir fengu menn fulla vísu  
um að Gunnlangur Guttormsson (um hvorn getib er í  
styrku mínu fyrir ár 1844 — 1845 bls. 5) hefði gefið frá  
fær að halda áfram skólalærdómi vegna viðvarandi þrilsu  
veiki hans. Nefndur C. C. P. Andersen er sonur Jens sál.  
Andersens, er fyrrum hafði verið urtafjalsari (Urteframmer)  
í Kaupmannahöfn og dó þar. Eingum af þessum í skóla  
nginuteknu var veitt nein olmuða, hverki heil né hálf; þar á  
móti var með ofanefndu skiptisprófaskólsins bréfi, dags. 17da júlí  
1845, þeirri 8½ olmuðu, er lausar urðu við útskrifan þeirra  
lærisveina er fráföru í fyrri vor, þannig útbýtt þeim fyrr-  
verandi skólans lærisveinum: að 1) Jakob Gudmund son  
sekk heila olmuðu, en þessum eytirfyllgjandi var veitt hverjum  
fyrir sig hálf. 2) Benedikt Gröndal. 3) Steffáni  
Gudnasyni. 4) Jannesi Sinsén. 5. Sveini Skúla-  
syni. 6. Selga Hálfdánarsyni. 7) Gudbrandi Vig-  
fúsyni. 8) Haldóri Gudmundsýni. 9) Brinjólfi  
Jónsýni. 10) Jóni Sinsén. 11) Jóni Þorvaldsýni.  
12) Þorkinni Jónathansýni. 13) Bergi Jónsýni. 13)  
Jóhannesi Haldórsýni; og lokins um jólateitib var já  
hálfu olmuðu, sem Gunnlangur Guttormsson fráför, veitt:  
14) Steffáni Thordarsén; svo allir í efrabekk þafa haft  
heila olmuðu síðstíðib skóla ár, nema Steffán Thorder-  
sen, Jón A. Blondahl og Selgi Hálfdánarson, sem  
einingis hálftrar olmuðu þafa notib; og Þórdur Jonassen,  
Páll Vidalin, Arni Thorsteinson, Þórarinn Þodvars-  
son, Jón Þorkelsson og Carl Andersen, sem einga ol-  
muðu þafa haft. Jón Þorkelsson og Þórarinn Þod-

varðson voru ei fyrir enu í hausti ed var innteknir í skólan, en Carl Andersen var ekki inntekinn í skólan sem reglulegur, hvørs áður er getið, fyrrrenn 1ta janúar. þ. á., þágang til var hann frá 1ta okt. f. á. einn af skólans aukalærifveinum\*).

Röð skólalærifveinanna í okt. 1845 varð alheilis þin sama sem hún varð þann 29da maí f. á. að undanteknu því, að nokkrir voru látnir eftir í nedrabelli, sem ofar voru,

\*) Aftur nefndi Carl's Andersens nutu 10 aukalærifveinar kennslu, 2 með efrifekkingum, en hinir 8 með nedrabelkingum, og urðu 4 þeirra að koma sér fyrir á öðrum bærum þeir í kring til húsnæðis, fæðis og annarar aðhjúfrunar. Kennslunnar í skólanum feingu þeir eigi með öðru móti að verða aðnjótandi, enn að þeir hvar rúmíð snerti, væru ekki til baka enu reglulegu lærifveinum, og að öðruleiti stæðu undir sömu lögum sem þessir (sjá stýrslu m. í fyrri, bls. 4 og 5.) Fleiri komu til skólans í þeirri von, að þeir með sama stýrði feingju að verða aðnjótandi kennslu í skólanum, en urðu að fara burt óþauþeyrdir og koma sér fyrir þingab og þágang annarstadar. Þágast er ef þetta bægir þeim frá að fá inngaungu í skólan síðar af því þeir séu orðnir ofgamlir; því nokkrum af þeim bagabi ekkert annað frá að fá inngaungu, enn rúmleysti í skólanum, en hvorki framfara né gáfnabrestur, og höfðu sumir optar enn einu sinni sótt um skólapláts áður forgefins, og komust þaríð framþfir þann lögstípaða aldur, sem eg nú ei veit hvor verður. Þíseulega held eg það gott að þreingri tafvork séu sett inntöku í skólan, edur hvar albur snertir, því mér finnst að eg hafi reyntu fyrir því, að hjá flestum verði lítill framþor í skóla, (hvar menn verða í einu að fást við svo margt) eftir það að menn komast langt yfir tvítugs albur; en óþeppilegt held eg það samt, ef menn allt í einu, hvar albur lærifveina snertir, brjóta yfir þvert þingabtil viðbasta venju; því það verður að ósanngirni, jafuvel ránglati, ef það stýlbi koma niður á nokkrum þeirra, er áður ein þeir voru orðnir ofgamlir, eftir þeirri eldri reglu, höfðu sótt um skóla, en þá ekki feingid, þegar þó máste aðrir toluvert eldri höfðu verið teknir framþfir þá, og það einmitt af því þeir voru eldri, og hinir nú fyrir alduresalir stýlbi útílofast frá inntöku í skólan, einungis fyrir þá skuld að þeir í fyrri stíptíð ekki voru meðteknir, og þaríð komust yfir þann ástílda albur.

heldurenn sumir þeir voru, er voru uppteknir í eskrifell, af því þinir höfðu ekki lesið það allt, sem í nedrífelli plagar að lesast. Þeir sem uppteknir voru úr nedrífelli voru settir fyrir neðan þá sem áður voru í eskrifell, en þeir nýinnteknu í skólan voru í hverjum belli fyrir sig settir neðstir, en niðurráðað sin á milli eptir því sem þeim tókst í stílprófinu (Examensfilnum) í október-mánaðar byrjun; og varð skólaröðin eptir því þessu: 1) **E s k r i f e l l**: 1) Þiriður Jónsson. 2) Steffán Thordersen. 3) Jón A. Blondahl. 4) Benedikt Gröndal. 5) Jóhann R. Benediktsson. 6) Benedikt Christjánsen. 7) Jón Snæbjørnsen. 8) Jónas Thorstensen. 9) Steffán Gudnason. 10) Magnús Thorlacius. 11) Bogi Thorarensen. 12) Páll Jónsson. 13) Þórdur Jonassen. 14) Arni Thorstensen. 15) Páll Vidalin. 16) Jakob Gudmundsson. 17) Hannes Sinsen. 18) Helgi Hálfdánarson. 19) Bjarni Thorlacius. 20) Magnús Grímsen. 21) Þrinjólfr Jónsson. 22) Jón Sinsen. 23) Fridrik Bjarnason. 24) Jón Þorðelsson. 25) Þórarinn Þóðvarsson. Nr. 16—23 sluttust úr nedrífelli upp í eskrifell; en Nr. 24 og 25 urðu fyrst reglulegir skólaárisveinar í haust (1845) og voru því settir neðstir í þessum\*). En II.) **N e d r í f e l l** varð röðin þessi: 1) Sveinn Skúlason. 2) Guðbrandur Vigfússon. 3) Haldór Gudmundsson. 4) Jón Þórdarson. 5) Jón Þorvaldsson. 6) Þorfinnur Jónathansson. 7) Bergur Jónsson. 8) Jóhannes Haldórsson. 9) Sigurgeir Jakobsen. 10) Skúli Gíslason. 11) Hermannus E. Jónsson. 12) Björn Pétursson. 13) Jacob Benediktsson. 14) Eggert M. Vaage. Nr. — 9 — 14 komu fyrst sem reglulegir í skólan í haust er var, og settust því eptir því sem þeirra latínslí still þá tókst þeim.

\*) Þið tolu eskrifelllinga báttist um nýárid Carl Andersen, um hvorn áður er getið, er fell þá fyrst skóla.

Hvornig roðin í báðum bekkjum umbreyttist við midsvestrar yfirheyrsluna sýnir Tablan A, sem eg þess vegna lét fylgja hér með, að eg gjöri mér í hugarlund, að þú kunni, ef til vill, geta orðið til einhvers leidarvísits, þegar menn að hausti komanda fara að skipta lærisveinunum í bekkina í þeim nýja skóla Reykjavíks, fyrst ekki værd í vor af yfirheyrslu þeirra lærisveina sem eptir urðu, af þeirri orsök, sem síðar skal verða tilgreind.

Þeim 7 lærisveinum, sem essir standa í esribekk, var laungu fyrir jól fyrirsett að þú sig undir að verða yfirheyrdir eptir nýárid í meiru og fleiru enn því sem yrði yfirfarid í skólanum frá octóbers byrjun til jóla, og tiltökum við strax hvað mikil væra skyldi í hverri lærdómsgrein útaf fyrir sig. Allir þessir 7 höfðu yfirfarid allan skólacursus, að það skóð ekki í vegi fyrir þeim að geta útstrífast, en við hugendum, að við á því hvornig þeir stæðu sig eptir nýárid, gætum betur séð hvornig þeir væru hæfilegir þartil, og þegar það reyndist, settum við þá essa í bekkinn, af því þeir voru yfirheyrdir í meiru enn þinir; og við þá opindru yfirheyrslu í vor þ. 22 — 25ta maí sannabist það, að þeir voru allir vel hæfir til þess að útstrífast, sem tablan B sýnir, er hér með fylgir. Rétt um það leitið sem yfirheyrslan átti að byrja og fáa daga á undan, fóru skólapiltar ódum að sýklast, hvors vegna Landslæknirinn, Justitzráð **Thorsten**sen var tilkvaddur að koma, eptir hvors ráðleggingu þeir sjúku voru stildir frá þeim beilbrigðu svo mikil sem þástrúmið leysdi, svo þessir skyldu ekki sýklast af þinum; en þá tala hinna sjúku fór að auflast með hverju dagri, svo þessi aðskilnadur gat eigi nema mjög ófullkomlega viðhæft, strífadi eg Stiptinu og réði til, að þeim sem eptir áttu að verða í skólanum, og væru ferðasærir vegna lasleila, ekki einasta leysdist að fara óyfirheyrðum í burtu, heldur hvettust til að tvístra sér sem fyrst. Þessu varð Stiptid samþykkt, og tilkinnnti mér með bréfi, dags. 23 maí, samþykki sitt, en að þeir sem útstrífast áttu, skyldi haldast til baka; og þetta var gjört, og held eg það hafi verið mikil heppni,

ad ad þessa var þyð fljótt undir, því fácinir sem eptir urðu á Bessastöðum eptir þann 30ta sama mánaðar, lögðust veikir af mislingajött, er fyrsta skip, sem kom til Hafnarfjardar í vör, flutti til Íslands; en því var leitt að skipið hefði haft sjúka af þessháttar veikni meðferðis, hvar fyrir söttin var fomin. Í land fyrrenn nokkurn vardi eða grynadi að það væri annað enn svefjött, sem hér geingur opt á vörum um sama tímabil, og breiddist fljótt út í fringum Hofnarfjörð. Þeir sem útskrifudust, sóttust þó ekki á meðan þeir voru á Bessastöðum; en allir, sem við höfum frétt til, sóttust síðar.

Þeirrar orsakar vegna, sem getið er um bls. 1, hefi eg enn nú umliðið stóla-ár kennt sömu lærdómsgreininir sem eg hefi kennt undanfarin ár; eins Dr. Scheving og kennari B. Gunnlaugsson; en í Dr. Sv. Egilssonar fjærveru, hefur málfræðingur, Vísi Magnússon upprætt í því, sem Dr. Sv. Egilsson hingad til þess kennt; hvað og hvornig hvor fyrir sig þess kennt segir hvor fyrir sig hér sjálfur frá.

1) Lector theologiæ Þór. Þóðsson: Eg hefi kennt umliðið ár: A, fristilegan trúarlærdóm: a) Í efrilek lagði eg til grundvallar í kenningu minni héri biskups Sogtmanns lærdómsbók, byrjadi á henni og lauk við fyrsta kapitulan.

b) Í nedrilek lagði eg til grundvallar Bohrs leidarvísir í einum fristilega trúarlærdómi fyrir nedri bekkni lærdra stóla, og byrjadi þar á, sem eg endadi í fyrri; eg byrjadi nefnilega á 83 S, á stýldunum við adra meun; og yfirfor og útlitadi það, sem eptir var af nefndri lærdómsbók, hana til enda. Í báðum bekkjum hefi eg í kenningu minni þagad mér list og undanfarin ár, um hvað eg hefi getið í minum undangangandi stýrslum. B) Í 17. T. hefi eg þetta ár útlitadi í efrilek 1 — 14. kap. Markúsar gudspjalls. Adur enn eg byrjadi á útsýringu minni, gat eg um hvor liflega væri þess höfundur, áreidalegleika gudspjallsins (Ariopistiom), og þess stýldugleika við Matthæusar

og Lúkasar gudsþjall og s. fr. C) 3 hebreöku þessi eg:  
a) 3 esribeff grammaticæ þýðisarið 21 — 32 kap. i Genesis  
ad undanteknum þeim 25 og 30 kap. sem ekki er vant að  
lesa. Um fátteitt þessi eg og getid sem lífa þénabi til flíla-  
ings á því lesna i öðru tilliti. b) Þýðir utan þá i lestrar-  
toflunni þýðisariðudu tíma — Þýðir taflan var þvad tíman  
snertir, en sama sem undansarin ár — þessi eg þýðisarið þad þelsta  
i Lindbergs hebreöku málfræði með flestum nedribeffingum og  
4 af aukalæriseveinunum. 2 af þeim reglulegu læriseveinunum i  
nedribeff þellu ei hebreökan bókstaf. Þáeinir af þvortutvegg-  
jum ætla að lesa gríöu i hebreöku flad. Þeim 7 sem ekki  
þesdu séð hebreöku áður, þessi eg orðid að kenna hebreöku út-  
af þýðir sig, og þessi blýðt þeim þýðir málfræðisreglurnar  
jafnóðt sem eg þafði útlíöad þar þýðir þeim, tíman á und-  
an, en síðan aptur þýðirþeyrt þá ásamt þinum, sem lesid þesdu  
Lindbergs málfræði áður, i stórnum köblum; og löðsins, þegar  
eg þannig var búinn að þýðisara þad þelsta i Lindbergs  
málfræði, las eg með öllum analyticæ þad sem eg átti eptir  
af 3ja kap. i Genesis i þýðra. D) esribeffinga þonöu flíla  
þessi eg 2ar i víöu lagfært, i annað flíptid alla, en þitt  
flíptid þelming. á möti Þra. philol. stud. Víska Magnús-  
spui. Eöuid til flílauna var fram til jóla íslendöst, optast  
tefid úr Eöirui, en eptir jólin tefid úr Ciceronis Parado-  
xis. 3 fladinn þýðir að setja læriseveinunum þýðir íslendöst eða  
latínöst þhema til að snúa á þonöu, lét eg esribeffinga töi-  
övar i vetur, i þýðra flinni flömmu þýðir jólin, i seinna flinni i  
martöi mánuði, flíöflega övara á þonöu uppá spuresmál sem  
eg þýðirlagði þeim úr gudfræðinni, og sat eg þýðir þeim á  
meðan þeir voru að övara þeim, og að öllu leiti þagabi mér  
eins og eg þessi getid um i flýöslu m. þýðir ár 1842 — 43  
blö. 11. Þá aukalæriseveina, sem nutu kennöslu með esribeff-  
ingum, lét eg gjöra allt þid sama sem hina læriseveinana.

2) Dr. philos. H. Eöeving. Storf nedribeffjar lærise-  
veina þýðisarið eins og að undansörunn á orðfræðinni i Mad-  
rige latínöslu málfræði, og föru fram á líöan þátt og frá er



sagt i minum fyrri skóla-árs skýrslum. Því næst yfirför eg þessar 3 ræður Ciceros: *Pro Roscio Amerino*, *Pro lege manilia* og *Pro Archia poeta*; og að því búið 1 og 2 bólf Horatii *Odarum*, að undanteknum þeim sem lauslatislegastar þýkja. Lét eg stíga hvort lag eptir því sem það kom fyrir, og gjöra grein fyrir þessu stúðlafellum. Af því mér urðu nokkrir dagar afgangi, þá Horatíi var lokið, lét eg nedrífekklar lærisveina með fljótri yfirferð lesa varnarræðu Ciceros: *Pro Ligario*. Eins og að undanfögnu þessi eg leiddrétt latínsta stíla hjá tveim hlutum bekkjarins, eins opt í vífu hverri og áður þessir verid. Með efrífekklar lærisveinum las eg öll Cicronis officia og Horatii *Epistolarum* 1u og 2ra bólf ásamt *Arte poetica*. Latínsta stíla efrífekklar þessi eg lagfært í vífu hverri eins opt og að undanfögnu.

3) Kennari skólans, Björn Gunnlaugsson. Skóla-árið 1845 — 1846 yfirför eg: 1) í báðum skólans bekkjum í landastipunarfræði eptir Velschov: Austurríki, Tyrkjalönd og Gríkkland, síðan inngang landastipunarfræðinnar, eptir somu bólf, og útlístaði dagsveltu og ársaungu jarðarinnar ásamt öðru er í innganginum nefnist, og löfsins var yfirfarid kóngsríkíð Danmörk. 2) Hjá efrífekklum yfirför eg reifningsfræði og algebru eptir Ursins lærðómsbólf. 3) Í nedrífekkl talnalífi eptir Ursins reifningsbólf; þannig voru yfirfarnar þær 4 reifningategundir í heilu og brotnu, þrífíða þeíllra og brotnra talna, samt þín ofuga þrífíða. 4) Yfirför eg í þenflu með lærisveinum í nedrífekkl í Rahþefs lestrarbókar 2ru bindi: Solbergs: smáðýraveíði; Sneedorffs: alþýðu; Rahþefs alþýðuróm; Suhms: samtál milli Leonidas og Jemenias; Solbergs: þonette Ambition; Prams líóðabréf Zíllippu brotnungar til Gríks frá Vadstena; Stokflets Zíllippu bréf; Lunds: Krístínar Ulfelds líóðabréf til manns síns; Liebenbergs: líóðabréf Baldemars annars til sonar síns; Evalds: síslara-drápu. 5) Löfsins þessi eg lagfært latínsta, íslendsta og dansta stíla, eins og að undanfögnu.

4) Gísli Magnússon, málfræðingur. Eg hef verið við skólan þetta ár, og hafst á hendi kennslu í þeim greinum, er Dr. Sveinbjörn Egilsson hefur hafst að undanförunu.

Með efskriflingum hef eg lesið grísku og dönsku, og nokkurn labla af mannfynnsöggunni. Í grísku sörum við fyrst yfir varnarræðu Sókratesar og Kriton, hvorutveggja eptir Platon heimspeking; síðan sörum við yfir þrjá labla af lestrarbók Flórs, 2ari útgáfu, frá bls. 153 til 162, og 323 til 333 og 337 til 349. Í mannfynnsöggunni sörum við yfir sögu Rómverja, og Dana og Norðmanna, Svía og Rússa. Parabauki hef eg einu sinni í vísu leiddrétt danska stíla hjá öðrum hverjum villti í efskrif.

Með nedrskriflingum hef jeg lesið grísku, og nokkud af mannfynnsöggunni. Í grísku sörum við yfir tvær bækurnar fyrstu af austurfor Sýrusar eptir Senoson, og í mannfynnsöggunni sama lablan og farinn var í efskrif. Hér að aul hef eg lagfært einu sinni í vísu latínsta stíla hjá sso nedrskriflingum, þeim er efsir voru í roðinni í haust.

Við kennsluna hef eg hafst líka aðferð, og vant er að þasa. Í efskrif las eg fyrst yfir nokkurn labla af varnarræðu Sókratesar; síðan lét eg pílta fara aptur yfir þann labla með mér, og gjöra einum grein fyrir orðastipun og sambandi efnisins. Þegar þessum labla var losið, og við höfðum tvísaríð í þann, lét eg pílta halda sjálfa áfram, og yfirfor með þeim á eptir. Þóttist eg með því móti geta faríð nægar yfir, þegar eigi þurfti að fara nema einu sinni yfir það sama. Í Hómer lét eg þá þasa útleggingu sér til studningo. Í nedrskrif las eg eigi heldur yfir á undan; þar höfðu og flestir piltar lesið áður, það sem faríð var. Mannfynnsögguna láðu piltar á áttundu útgáfuna af Rófóð; eg setti þeim fyrir labla og labla, og fór yfir með þeim jafuóðum á eptir. Þá töl jeg helst fram, það sem mér þótti eitthvæð í varíð, og leitabíð við að greiða sambandið, og líðla betur til, þar sem eitthvæð var óþitt í bófinni. Í

deusku fór eg mest eptir réttum skilningi anda og efnis, og attfærði stundum ord til framtungu fedra vorra. Í skilum gjörði eg mér mest far um að þeir væru óbrottnir og líðugir, og ord eigi illa vöndub.

---

Í minni næst undangangandi skýrslu, nefnilega fyrir skólaárið 1844 — 45 bls. 12 og 13 gat eg um, að eg hefði skrifad stíptöfyrirvöldunum í Íslandi á þá leið: að ef til þess skylði koma, að hið konúnglega stjórnarráð Háskólans og hinna lærðu skóla í Danmörku þætti að sjá skólunum fyrir naudsýnlegum bókum, yrði að sýrgja fyrir því, að einhver í Reykjavík tækist það á hendur, að naudsýnlegar bækur fyrir lærifveinana væri þar sáanlegar til kaups. En það kom eigi til þess að þessa meðþyrfti skóla-árid sem líðið er, því bæði með bréfi, dags. 27. maí s. á. (1845) sendi hið konúnglega Háskólaráð bækur til skólans bókahýrslu, og aptur með pósthípi í hausti ed var, naudsýnlegar bækur handa lærifveinunum til kaups og undireins nokkrar bækur til bókhýrðslunnar, sem flest allar voru bókrit frá háskólum og skólum Danmerkur og Hertogadæmanna og frá Prússaríkis-skólum.

Einginn lærifveinn hefur þetta skóla-ár feingid nokkurn þírk til bóka kaupa, vegna þess eg hélt það forgefins að selja þarum, þaræd eg óttadist að stíptöfyrirvöldin mundu álita sig eigi hafa mindugleika að veita hann eptir bréfi Háskólastjórnarráðsins, 28. maí 1844, sem eg gat um í skýrslu minni í fyrra.

---

## Prentvillur

í fyrra parti Læðarvísisins.

Bls. 40. línu 10 ab neðan: Epsilon, les: Ypsilon.

í síðara parti.

Bls. 17. línu 12 ab ofan: mætist les: mælist.





# C A F F A B.

um það, hvernig hverjum þeirra fyrir sig, sem útskrifað, tekið hefur í hverri lærdómsgrein útaf fyrir sig í því opinbera lærdómsfráufsara prófi sem haldid var þann 22—25. maí 1846.

Tala.	N e f n i n	Latina.	Lat. still.	Griísa.	Danísa.	Daníkur still.	Jes. still.	Hebreísa.	Utií. N. T.	Trúar- Lærdóm.	Berakbar- saga.	Landa- stipunfr.	Rúm- málsfr.	Talna- frædi.	Summa.
1.	Jón Audun Blondal	ág.	dáv.	ág.	ág.	dáv.	dáv.	ág.	dáv.	dáv.	ág.	ág.	ág.	ág.	100.
2.	Eyriíkur Jónsón . . .	ág.	vel.	ág.	ág.	vel.	dáv.	ág.	ág.	ág.	ág.	ág.	ág.	ág.	99.
3.	Stephán Kelgason . .	dáv.	dáv.	ág.	ág.	dáv.	dáv.	ág.	ág.	dáv.	ág.	ág.	dáv.	dáv.	97.
4.	Bogi Thorarensen . . .	dáv.	dáv.	dáv.	ág.	dáv.	vel.	dáv.	ág.	ág.	ág.	ág.	ág.	ág.	97.
5.	Jóhann R. Benediktson	ág.	vel.	ág.	dáv.	vel.	vel.	ág.	dáv.	dáv.	dáv.	ág.	ág.	ág.	93.
6.	Jónas Thorstensen . .	ág.	vel.	dáv.	ág.	dáv.	vel.	dáv.	dáv.	vel.	vel.	ág.	ág.	ág.	91.
7.	Benidikt Grøndal . . .	ág.	vel.	ág.	ág.	dáv.	vel.	ág*.	vel.	gá.	ág.	ág.	vel.	vel.	89.

\* Þáðir að griísa hefur verið lesin fyrir hebreísa.

B e s s a f t a d a f k ó l a þann 25ta Maí 1846.

A. Kelgason. Ch. Jónassen. S. Hallgrímsson.

J. Jóhansen. S. Scheving. B. Sunlógfen. G. Magnússon.





# Yfirheyrslan

## Þ E S S A S T A D A S A Ó F A

framfer í þessari röð þannu 22 — 28. maí 1846.

Föstudag.	f. m.	8	—	10 $\frac{1}{2}$	verða	Eb.	Lærifveinar	reynbir			i fríðilegum trúarlærdómi.
		10 $\frac{1}{2}$	—	11 $\frac{1}{4}$	—	Nb.	—	—			i fríðilegum trúarlærdómi.
		11 $\frac{1}{4}$	—	12	—	Eb.	—	—			i landaþingunarfræði.
		e. m.	2	—	6	—	allir	stóla-lærifveinar	—		i latíniskum stíl.
Laugardag.	f. m.	8	—	10	—	Eb.	Lærifveinar	reynbir			i gríflu.
		10	—	12 $\frac{1}{2}$	—	Nb.	og þeir	sem útfríð.			i íslenskum stíl.
		e. m.	2 $\frac{1}{2}$	—	6	—	allir	lærifveinarnir	—		i þönskum stíl.
		—	—	—	—	—	—	—			—
Mánudag.	f. m.	8	—	10 $\frac{1}{2}$	—	Nb.	og auka-lærif.	—			i latínu.
		—	—	10 $\frac{1}{2}$	—	Eb.	—	—			i veraldarseggunni.
		e. m.	2	—	3 $\frac{1}{2}$	verða	þeir	sem útfríðast	reynbir		i latínu.
		—	—	—	—	—	—	—			—
Þriðjudag.	f. m.	8	—	9	—	—	—	—			i þönsku.
		9	—	9 $\frac{1}{2}$	—	—	—	—			i landaþingunarfræði.
		9 $\frac{1}{2}$	—	10 $\frac{1}{2}$	—	—	—	—			i fríðilegum trúarlærdómi.
		10 $\frac{1}{2}$	—	12 $\frac{1}{2}$	—	—	—	—			i reifningi og rámmálsfr.
Mikvifudag.	f. m.	2	—	3 $\frac{1}{2}$	—	—	—	—			i veraldarseggunni.
		—	—	—	—	—	—	—			—
		3 $\frac{1}{2}$	—	4 $\frac{1}{2}$	—	—	—	—			i stílningi N. T.
		4 $\frac{1}{2}$	o. f.	frv.	verður	dómur	lagður á	framsfarir	þeirra, sem útfríðast eiga, og tafla um þad samín.		
Mikvifudag.	f. m.	8	—	10 $\frac{1}{4}$	verða	Nb.	og auka-lærifveinar	reynbir			i gríflu.
		10 $\frac{1}{4}$	—	12	verður	Eb.	Lærifveinar	—			i stílningi N. T.
		e. m.	2	—	4	—	Eb.	—			i reifningi.
		—	—	—	—	—	—	—			—
Fimmtudag.	f. m.	8	—	9 $\frac{1}{4}$	—	Eb.	—	—			i fríðilegum trúarlærdómi.
		9 $\frac{1}{4}$	—	12	—	Eb. og Nb.	—	—			i landaþingunarfræði.
		e. m.	2	—	3 $\frac{1}{2}$	—	Nb.	—			i þönsku.
		—	—	—	—	—	—	—			—
Fimmtudag.	f. m.	8	—	9 $\frac{1}{4}$	—	Eb.	—	—			i þönsku.
		9 $\frac{1}{4}$	—	12	—	Eb. og Nb.	—	—			i reifningi.
		e. m.	2	—	3 $\frac{1}{2}$	—	Nb.	—			i veraldarseggunni.
		—	—	—	—	—	—	—			—
Fimmtudag.	f. m.	8	—	9 $\frac{1}{4}$	—	Eb.	—	—			i þönsku.
		9 $\frac{1}{4}$	—	12	—	Eb. og Nb.	—	—			i reifningi.
		e. m.	2	—	3 $\frac{1}{2}$	—	Nb.	—			i veraldarseggunni.
		—	—	—	—	—	—	—			—

Eftir það að yfirheyrslan er endub, verða atkvæði samanhörin, og dómur lagður á, hvernig hverjum lærifveini þeirra seu eftir verða, þessu tekið í þetta stinn, og tafla um það samín, sem fylgir stólaþesslunni ásamt þeirri, sem um framsfarir þeirra, er útfríðast, samín verður.

Þessastada-skóla þann 5ta maí 1846.



